

# Preliminaria logiczne

Jerzy Pogonowski

Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM  
[www.kognitywistyka.amu.edu.pl](http://www.kognitywistyka.amu.edu.pl)  
<http://logic.amu.edu.pl/index.php/Dydaktyka>  
[pogon@amu.edu.pl](mailto:pogon@amu.edu.pl)

MDTiAR

# Plan na dziś

- Udowodnimy Lemat Hintikki (dla KRZ).
  - Wprowadzimy pojęcie *własności niesprzeczności*.
  - Udowodnimy twierdzenie o istnieniu modelu (dla KRZ).
  - Udowodnimy twierdzenie o zwartości (dla KRZ).
- 
- Poznamy ogólne operacje konsekwencji.
  - Poznamy operacje konsekwencji wyznaczone przez reguły, konsekwencje matrycowe oraz odrzucające.
- 
- Poznamy kilka przydatnych pojęć algebraicznych:
    - Kraty
    - Algebry Heytinga
    - Algebry Boole'a

# Zbiory Hintikki

Zbiór  $\mathbf{H}$  formuł języka KRZ nazywamy *zdaniowym zbiorem Hintikki*, jeśli:

- 1 Dla dowolnej zmiennej zdaniowej  $p$ , zachodzi co najmniej jedno z dwojga:  $p \in \mathbf{H}$  lub  $\neg p \in \mathbf{H}$
  - 2  $\perp \notin \mathbf{H}$  oraz  $\neg \top \notin \mathbf{H}$ ;
  - 3 Jeśli  $\neg\neg\psi \in \mathbf{H}$ , to  $\psi \in \mathbf{H}$ ;
  - 4 Jeśli  $\alpha \in \mathbf{H}$ , to  $\alpha_1 \in \mathbf{H}$  oraz  $\alpha_2 \in \mathbf{H}$ ;
  - 5 Jeśli  $\beta \in \mathbf{H}$ , to  $\beta_1 \in \mathbf{H}$  lub  $\beta_2 \in \mathbf{H}$ .
- Zbiory Hintikki nazywa się także zbiorami *nasyconymi w dół* (*downward saturated*). Może trafniej byłoby mówić: *nasycone w głąb*? Cantor mówił podobno, że wyobraża sobie zbiory jako *przepaście*.

# Lemat Hintikki

**Lemat Hintikki.** Każdy zdaniowy zbiór Hintikki jest spełnialny.

**Dowód.** Niech  $\mathbf{H}$  będzie zbiorem Hintikki. Zbudujemy wartościowanie  $v$ , przy którym każdy element zbioru  $\mathbf{H}$  przyjmie wartość 1.

- Jeśli  $p \in \mathbf{H}$ , to niech  $v(p) = 1$ . Jeśli  $\neg p \in \mathbf{H}$ , to niech  $v(p) = 0$ . Jeśli ani  $p$  ani  $\neg p$  nie należą do  $\mathbf{H}$ , to niech  $v(p) = 0$ . Wreszcie, niech  $v(\perp) = v(\neg\top) = 0$ .
- Jak pamiętamy z semantyki KRZ, wartościowanie  $v$  można jednoznacznie rozszerzyć do odwzorowania  $v^*$  wszystkich formuł zdaniowych w zbiór  $\{0, 1\}$ .
- Wtedy  $v^*(\psi) = 1$  dla wszystkich  $\psi \in \mathbf{H}$ , czego dowodzimy np. przez indukcję po randze formuł.

# Lemat Hintikki

- Dla zmiennych zdaniowych mamy  $v^*(p) = 1$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $p \in \mathbf{H}$ . Dalej,  $v^*(\perp) = v^*(\neg\top) = 0$  na mocy definicji  $v$ . Tak więc,  $v^*(\psi) = 1$  dla wszystkich formuł o randze 0 należących do  $\mathbf{H}$ .
- Załóżmy, że dla wszystkich formuł  $\psi \in \mathbf{H}$  rangi mniejszej od  $n > 0$  zachodzi  $v^*(\psi) = 1$ .
- Jeśli  $\alpha$  ma rangę  $n$ , to  $\alpha_1$  oraz  $\alpha_2$  są elementami  $\mathbf{H}$  oraz mają rangę mniejszą od  $n$ . Z założenia indukcyjnego  $v^*(\alpha_1) = 1 = v^*(\alpha_2)$ . Wtedy  $v^*(\alpha) = 1$ .
- Jeśli  $\beta$  ma rangę  $n$ , to albo  $\beta_1 \in \mathbf{H}$  albo  $\beta_2 \in \mathbf{H}$ . Nadto,  $\beta_1$  oraz  $\beta_2$  mają rangę mniejszą od  $n$ . Z założenia indukcyjnego: albo  $v^*(\beta_1) = 1$  albo  $v^*(\beta_2) = 1$ . A zatem  $v^*(\beta) = 1$ .

# Sprzeczność to śmierć logiczna

Niech  $\mathcal{C}$  będzie rodziną zbiorów formuł języka KRZ. Mówimy, że  $\mathcal{C}$  *zdaniową własnością niesprzeczności* (*propositional consistency property*), jeśli dla każdego zbioru  $S \in \mathcal{C}$ :

- 1 Dla każdej zmiennej zdaniowej  $p$ : albo  $p \notin S$  albo  $\neg p \notin S$
- 2  $\perp \notin S$  oraz  $\neg \top \notin S$
- 3 Jeśli  $\neg\neg\psi \in S$ , to  $S \cup \{\psi\} \in \mathcal{C}$
- 4 Jeśli  $\alpha \in S$ , to  $S \cup \{\alpha_1, \alpha_2\} \in \mathcal{C}$
- 5 Jeśli  $\beta \in S$ , to  $S \cup \{\beta_1\} \in \mathcal{C}$  lub  $S \cup \{\beta_2\} \in \mathcal{C}$ .

- Tak więc, każda własność niesprzeczności jest rodziną zbiorów, spełniającą pewne warunki domknięcia.
- Jeśli  $S \in \mathcal{C}$ , to mówimy, że  $S$  jest  $\mathcal{C}$ -*niesprzeczny*.

## Przykłady

- Rodzina wszystkich zbiorów niesprzecznych jest zdaniową własnością niesprzeczności.
  - Rodzina wszystkich zbiorów spełnialnych jest zdaniową własnością niesprzeczności.
  - Rodzina wszystkich zbiorów, których każdy skończony podzbiór jest spełnialny, jest zdaniową własnością niesprzeczności.
- 
- Nazwiemy zbiór formuł  $S$  *tablicowo niesprzecznym*, gdy nie istnieje zamknięta tablica analityczna dla  $S$ . Rodzina wszystkich zbiorów tablicowo niesprzecznych jest zdaniową własnością niesprzeczności.
  - Pojęcie *własności niesprzeczności* można określić także dla logiki pierwszego rzędu.
  - Pojęcie *własności niesprzeczności* można określić dla różnych metod dowodowych.

# Oswajanie własności niesprzeczności

- Własność niesprzeczności  $\mathcal{C}$  jest *domknięta na podzbiory*, gdy dla każdego  $S \in \mathcal{C}$  oraz wszystkich  $T \subseteq S$ :  $T \in \mathcal{C}$ .
- Własność niesprzeczności  $\mathcal{C}$  jest *charakteru skończonego*, gdy:  $S \in \mathcal{C}$  wtedy i tylko wtedy, gdy każdy skończony podzbiór zbioru  $S$  należy do  $\mathcal{C}$ .

- 1 Każda własność niesprzeczności może zostać rozszerzona do własności niesprzeczności domkniętej na podzbiory.
- 2 Każda własność niesprzeczności charakteru skończonego jest domknięta na podzbiory.
- 3 Każda własność niesprzeczności domknięta na podzbiory może zostać rozszerzona do własności niesprzeczności charakteru skończonego.

Ćwiczenie: udowodnij powyższe punkty 1–3 (konwersatorium).



## Przerywnik muzyczny: Logic rap

### Profesor:

*Bierzemy ciąg niesprzecznych zbiorów, wstępujący ściśle.*

*To jaka jest ich suma, niech ja tylko pomyślę.*

*Ona też jest niesprzeczna, mój młody kolego.*

*Ty pytasz: panie psorze, ach, dlaczego, dlaczego?*

*Dowód podam nie wprost, jak w kościele na tacę.*

*Przypuśćmy, drodzy goście, że byłoby inaczej.*

*Gdyby była sprzeczna, no to nie ma siły:*

*Sprzeczność już na którymś piętrze by się pojawiła.*

*Co przeczy założeniu oraz kończy dowód.*

### Studenci:

*I wszystkim nam dostarcza doskonały powód,*

*By zakończyć ten wykład i żywo na piwo!*

- 1 Pierwsze założenie za mocne, ale ratuje rym.
- 2 Były jeszcze dwie (obsceniczne) linijki, które tu opuszczamy.

## Domkniętość na sumy łańcuchów

- Załóżmy, że  $\mathcal{C}$  jest własnością niesprzeczności charakteru skończonego oraz że  $S_1, S_2, S_3, \dots$  jest łańcuchem wstępującym (ze względu na inkluzję) elementów rodziny  $\mathcal{C}$ . Wtedy  $\bigcup_n S_n \in \mathcal{C}$ .

**Dowód.** Ponieważ  $\mathcal{C}$  jest własnością niesprzeczności charakteru skończonego, więc wystarczy udowodnić, że każdy skończony podzbiór zbioru  $\bigcup_n S_n$  należy do  $\mathcal{C}$ .

Przypuśćmy, że  $\{\psi_1, \dots, \psi_k\} \subseteq \bigcup_n S_n$ . Pokażemy, że  $\{\psi_1, \dots, \psi_k\} \in \mathcal{C}$ .

Dla każdego  $1 \leq i \leq k$  istnieje najmniejszy indeks  $n_i$  taki, że  $\psi_i \in S_{n_i}$ . Niech  $m = \max\{n_1, \dots, n_k\}$ . Wtedy  $\psi_i \in S_m$  dla wszystkich  $1 \leq i \leq k$ . Ponieważ  $S_m \in \mathcal{C}$  oraz  $\mathcal{C}$  jest domknięta na podzbiory, więc  $\{\psi_1, \dots, \psi_k\} \in \mathcal{C}$ .

## Niesprzeczność daje szansę

**Twierdzenie o Istnieniu Modelu** (dla KRZ). Jeśli  $\mathcal{C}$  jest zdaniową własnością niesprzeczności oraz  $S \in \mathcal{C}$ , to  $S$  jest spełnialny.

- Twierdzenie to będzie wielokrotnie wykorzystane w dowodach pełności rozważanych metod dowodowych.
- Dowód tego twierdzenia istotnie korzysta z Lematu Hintikki.
- Zasadniczy pomysł polega na tym, że każdy zbiór  $S$  z rozważanej własności niesprzeczności  $\mathcal{C}$  można rozszerzyć do pewnego zbioru Hintikki  $\mathbf{H}_S$ , również należącego do  $\mathcal{C}$ . Skoro  $S \subseteq \mathbf{H}_S$ , a  $\mathbf{H}_S$  jest spełnialny (Lemat Hintikki!), to również  $S$  jest spełnialny.

# Dowód Twierdzenia o Istnieniu Modelu

- Załóżmy, że  $S \in \mathcal{C}$ .
- Na mocy poprzednich ustaleń możemy założyć, że  $\mathcal{C}$  jest charakteru skończonego.
- Ustawiamy wszystkie formuły języka KRZ w ciąg przeliczalny:  $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \dots$  (w porządku leksykograficznym).
- Definiujemy ciąg  $S_1, S_2, S_3, \dots$  elementów  $\mathcal{C}$  w sposób następujący:
  - $S_1 = S$
  - $S_{n+1} = S_n \cup \{\psi_n\}$ , o ile  $S_n \cup \{\psi_n\} \in \mathcal{C}$ , natomiast  $S_{n+1} = S_n$  w przeciwnym przypadku.
- Wszystkie elementy tego ciągu należą do  $\mathcal{C}$  i tworzą łańcuch wstępujący. Niech  $\mathbf{H}_S = \bigcup_n S_n$ . Wtedy  $S \subseteq \mathbf{H}_S$ .
- Ponieważ  $\mathcal{C}$  jest charakteru skończonego i jest domknięta na sumy łańcuchów, więc  $\mathbf{H}_S \in \mathcal{C}$ .

## Dowód Twierdzenia o Istnieniu Modelu

$\mathbf{H}_S$  jest elementem maksymalnym w  $\mathcal{C}$ : Przypuśćmy, że istnieje  $K \in \mathcal{C}$  taki, że:  $\mathbf{H}_S \subseteq K$  oraz  $\mathbf{H}_S \neq K$ . Wtedy istnieje  $\psi_n \in K - \mathbf{H}_S$ . Oznacza to, że  $\psi_n \notin S_{n+1}$ , a zatem  $S_n \cup \{\psi_n\} \notin \mathcal{C}$ .

Jednak  $S_n \cup \{\psi_n\} \subseteq K$ , ponieważ  $S_n \subseteq \mathbf{H}_S \subseteq K$  oraz  $\psi_n \in K$ . Ponieważ  $\mathcal{C}$  jest domknięta na podzbiory, więc  $S_n \cup \{\psi_n\} \in \mathcal{C}$ , sprzeczność.

$\mathbf{H}_S$  jest zbiorem Hintikki: Warunki dla zmiennych zdaniowych oraz  $\perp$  i  $\neg \top$  zachodzą na mocy konstrukcji zbioru  $\mathbf{H}_S$  oraz definicji rodziny  $\mathcal{C}$ . Jeśli  $\neg\neg\psi \in \mathbf{H}_S$ , to  $\psi \in \mathbf{H}_S$ , ponieważ  $\mathbf{H}_S \in \mathcal{C}$ . Załóżmy, że  $\alpha \in \mathbf{H}_S$ . Ponieważ  $\mathbf{H}_S \in \mathcal{C}$ , więc  $\mathbf{H}_S \cup \{\alpha_1, \alpha_2\} \in \mathcal{C}$ . Ponieważ  $\mathbf{H}_S$  jest maksymalny, więc  $\{\alpha_1, \alpha_2\} \subseteq \mathbf{H}_S$ . Załóżmy, że  $\beta \in \mathbf{H}_S$ . Ponieważ  $\mathbf{H}_S \in \mathcal{C}$ , więc  $\mathbf{H}_S \cup \{\beta_1\} \in \mathcal{C}$  lub  $\mathbf{H}_S \cup \{\beta_2\} \in \mathcal{C}$ . Ponieważ  $\mathbf{H}_S$  jest maksymalny, więc  $\beta_1 \in \mathbf{H}_S$  lub  $\beta_2 \in \mathbf{H}_S$ .

Na mocy Lematu Hintikki  $S$  jest spełnialny, ponieważ  $S \subseteq \mathbf{H}_S$ .

# Zastosowanie Twierdzenia o Istnieniu Modelu

**Twierdzenie o Zwartości.** Niech  $S$  będzie zbiorem formuł języka KRZ. Jeśli każdy skończony podzbiór zbioru  $S$  jest spełnialny, to  $S$  jest spełnialny.

**Dowód.** Załóżmy, że każdy skończony podzbiór zbioru  $S$  jest spełnialny. Plan dowodu jest następujący:

- Definiujemy rodzinę  $\mathcal{C}$  zbiorów formuł języka KRZ jako rodzinę tych wszystkich zbiorów formuł, których każdy skończony podzbiór jest spełnialny.
- Wtedy oczywiście  $S \in \mathcal{C}$ .
- Trzeba będzie pokazać, że  $\mathcal{C}$  jest własnością niesprzeczności.
- Następnie wystarczy skorzystać z Twierdzenia o Istnieniu Modelu.

## Dowód Twierdzenia o Zwartości

Przypuśćmy, że  $W \in \mathcal{C}$  oraz  $\{p, \neg p\} \subseteq W$  dla pewnej zmiennej zdaniowej  $p$ . Zbiór  $\{p, \neg p\}$  jest skończony, ale nie jest spełnialny, a więc początkowe przypuszczenie musi zostać odrzucone.

Oczywiście, jeśli  $W \in \mathcal{C}$  oraz  $\neg\neg\psi \in W$ , to  $W \cup \{\psi\} \in \mathcal{C}$ .

Założmy, że  $W \in \mathcal{C}$  oraz  $\alpha \in W$ . Pokażemy, że każdy skończony podzbiór zbioru  $W \cup \{\alpha_1, \alpha_2\}$  jest spełnialny, czyli  $W \cup \{\alpha_1, \alpha_2\} \in \mathcal{C}$ . Skończony podzbiór zbioru  $W \cup \{\alpha_1, \alpha_2\}$  może: nie zawierać żadnej z formuł  $\alpha_1, \alpha_2$ , zawierać dokładnie jedną z nich, zawierać obie. Wystarczy rozważyć ostatni przypadek, czyli  $W_0 \cup \{\alpha_1, \alpha_2\}$ , gdzie  $W_0$  jest skończonym podzbiorem  $W$ . Wtedy  $W_0 \cup \{\alpha\}$  też jest skończonym podzbiorem  $W$ , a więc jest spełnialny. Dowolne wartościowanie posyłające każdy element zbioru  $W_0 \cup \{\alpha\}$  w 1 musi zatem posyłać w 1 zarówno  $\alpha_1$  jak i  $\alpha_2$ . Oznacza to, że  $W_0 \cup \{\alpha, \alpha_1, \alpha_2\}$  jest spełnialny, z zatem  $W_0 \cup \{\alpha_1, \alpha_2\}$  jest spełnialny.

# Dowód Twierdzenia o Zwartości

- Załóżmy, że  $W \in \mathcal{C}$  oraz  $\beta \in W$ . Pokażemy, że: albo  $W \cup \{\beta_1\} \in \mathcal{C}$  albo  $W \cup \{\beta_2\} \in \mathcal{C}$ . Niech  $W_0$  będzie skończonym podzbiorem  $W$ .
- $W_0 \cup \{\beta\}$  także jest skończonym podzbiorem  $W$ , a więc jest spełnialny: istnieje wartościowanie  $v$  posyłające każdy element zbioru  $W_0 \cup \{\beta\}$  w 1.
- Na mocy definicji wartościowań: albo  $v(\beta_1) = 1$  albo  $v(\beta_2) = 1$ .
- W konsekwencji, wartościowanie  $v$  posyła w 1: albo wszystkie elementy zbioru  $W_0 \cup \{\beta, \beta_1\}$  albo wszystkie elementy zbioru  $W_0 \cup \{\beta, \beta_2\}$ . Tak więc: albo  $W_0 \cup \{\beta, \beta_1\}$  albo  $W_0 \cup \{\beta, \beta_2\}$  jest spełnialny.
- Ponieważ podzbiór zbioru spełnialnego jest spełnialny, więc: albo  $W_0 \cup \{\beta_1\}$  albo  $W_0 \cup \{\beta_2\}$  jest spełnialny.
- Ostatecznie: albo  $W \cup \{\beta_1\} \in \mathcal{C}$  albo  $W \cup \{\beta_2\} \in \mathcal{C}$ .



# Operacje i relacje konsekwencji w sensie Tarskiego

Ogólna *operacja konsekwencji*  $C$  w ustalonym języku o zbiorze formuł  $F$  to operacja  $C : \wp(F) \rightarrow \wp(F)$ , spełniająca warunki:

- (C 1)  $X \subseteq C(X)$  (zwrotność)
- (C 2) Jeśli  $X \subseteq Y$ , to  $C(X) \subseteq C(Y)$  (monotoniczność)
- (C 3)  $C(C(X)) \subseteq C(X)$  (idempotencja)
- (C 4)  $C(X) \subseteq \bigcup \{C(Y) : Y \subseteq X \wedge \overline{\overline{Y}} < \aleph_0\}$  (finitystyczność).

Ogólna *relacja konsekwencji*  $\vdash \subseteq \wp(F) \times F$  określona jest przez warunki:

- ( $\vdash$  1)  $X \vdash \psi$  dla każdej  $\psi \in X$
- ( $\vdash$  2) Jeśli  $X \vdash \psi$  i  $X \subseteq Y$ , to  $Y \vdash \psi$
- ( $\vdash$  3) Jeśli  $X \vdash \varphi$  dla każdej  $\varphi \in Y$  oraz  $Y \vdash \psi$ , to  $X \vdash \psi$
- ( $\vdash$  4) Jeśli  $X \vdash \psi$ , to istnieje  $Y$  taki, że:  $Y \subseteq X$ ,  $\overline{\overline{Y}} < \aleph_0$  oraz  $Y \vdash \psi$ .

## Relacje konsekwencji w sensie Scotta

*Relacją konsekwencji w sensie Scotta* w ustalonym języku nazywamy relację  $\vdash$  między zbiorami formuł tego języka, która spełnia następujące warunki:

- *Zwrotność.*  $\{\varphi\} \vdash \{\varphi\}$
- *Monotoniczność.* Jeśli  $X_1 \subseteq X_2$ ,  $Y_1 \subseteq Y_2$  oraz  $X_1 \vdash Y_1$ , to  $X_2 \vdash Y_2$
- *Przechodniość.* Jeśli  $X \vdash Y \cup \{\varphi\}$  oraz  $\{\varphi\} \cup X \vdash Y$ , to  $X \vdash Y$ .

- Uwaga. O ogólnych operacjach i relacjach konsekwencji jedynie wspominamy w tym miejscu. Każda z omawianych dalej metod dowodowych wyznacza takie operacje i relacje.
- Celem tego wykładu jest jednak nie badanie (ciekawych!) własności ogólnych operacji i relacji konsekwencji, ale praktyczne oswojenie się z wybranymi metodami dowodowymi.

# Wreszcie! Reguły.

Niech  $\mathcal{R}$  będzie dowolną rodziną reguł wnioskowania w ustalonym języku o zbiorze formuł  $F$ . Przez *operację konsekwencji w tym języku wyznaczoną przez  $\mathcal{R}$*  rozumiemy każdą funkcję  $C_{\mathcal{R}} : \wp(F) \rightarrow \wp(F)$ , zdefiniowaną indukcyjnie następującymi warunkami dla dowolnego zbioru formuł  $X$  tego języka:

$$C_{\mathcal{R}}^0(X) = X$$

$$C_{\mathcal{R}}^{k+1}(X) = C_{\mathcal{R}}^k(X) \cup \{\psi \in F : (\exists R \in \mathcal{R})(\exists P \subseteq C_{\mathcal{R}}^k(X)) (P, \psi) \in R\}$$

$$C_{\mathcal{R}}(X) = \bigcup \{C_{\mathcal{R}}^k(X) : k \in \mathbb{N}\}.$$

Wyrażenie  $\psi \in C_{\mathcal{R}}(X)$  czytamy:  $\psi$  jest wyprowadzalna z  $X$  za pomocą reguł należących do  $\mathcal{R}$ . Oczywiście jeśli  $n < m$ , to  $C_{\mathcal{R}}^n(X) \subseteq C_{\mathcal{R}}^m(X)$ .

Niech  $Cld(\mathcal{R}, X)$  oznacza, że zbiór formuł  $X$  jest *domknięty na wszystkie reguły ze zbioru  $\mathcal{R}$* :  $Cld(\mathcal{R}, X)$  wtedy i tylko wtedy, gdy

$$(\forall R \in \mathcal{R})(\forall P \subseteq F)(\forall \psi \in F)((P, \psi) \in R \wedge P \subseteq X) \rightarrow \psi \in X).$$

# Nie powinnaś być zaskoczona, że:

- 1  $\psi \in C_{\mathcal{R}}(X)$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $\psi \in Y$  dla każdego zbioru  $Y$  takiego, że  $X \subseteq Y$  oraz  $Cld(\mathcal{R}, Y)$ .
- 2 Jeśli  $((P, \psi) \in R \wedge R \in \mathcal{R})$ , to  $\psi \in C_{\mathcal{R}}(P)$ .
- 3 Jeśli  $((P, \psi) \in R \wedge R \in \mathcal{R} \wedge P \subseteq C_{\mathcal{R}}(X))$ , to  $\psi \in C_{\mathcal{R}}(X)$ .
- 4  $X \subseteq C_{\mathcal{R}}(X)$  (zwrotność).
- 5 Jeśli  $X \subseteq Y$ , to  $C_{\mathcal{R}}(X) \subseteq C_{\mathcal{R}}(Y)$  (monotoniczność).
- 6 Jeśli  $\mathcal{R}_1 \subseteq \mathcal{R}_2$ , to  $C_{\mathcal{R}_1}(X) \subseteq C_{\mathcal{R}_2}(X)$  (monotoniczność).
- 7  $C_{\mathcal{R}}(C_{\mathcal{R}}(X)) = C_{\mathcal{R}}(X)$  (idempotencja).
- 8  $C_{\mathcal{R}}(X) = \bigcup \{C_{\mathcal{R}}(Y) : Y \subseteq X \wedge \overline{\overline{Y}} < \aleph_0\}$  (finitystyczność).
- 9  $C_{\mathcal{R}}(X) = \bigcup \{C_{\mathcal{R}'}(X) : \mathcal{R}' \subseteq \mathcal{R} \wedge \overline{\overline{\mathcal{R}'}} < \aleph_0\}$  (finitystyczność).
- 10 Niech  $\mathcal{X} \neq \emptyset$  oraz  $X \subseteq Y$  lub  $Y \subseteq X$  dla  $X, Y \in \mathcal{X}$ . Wtedy  $C_{\mathcal{R}}(\bigcup \{X : X \in \mathcal{X}\}) = \bigcup \{C_{\mathcal{R}}(X) : X \in \mathcal{X}\}$ .

## Co wolno

Zbiór  $Adm(\mathcal{R}, X)$  wszystkich reguł *dopuszczalnych* ze względu na  $X$  i  $\mathcal{R}$  definiujemy następująco:

$R \in Adm(\mathcal{R}, X)$  wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego  $P \subseteq F$  oraz każdej  $\psi \in F$ : jeśli  $(P, \psi) \in R$  i  $P \subseteq C_{\mathcal{R}}(X)$ , to  $\psi \in C_{\mathcal{R}}(X)$ .

Zbiór  $Der(\mathcal{R}, X)$  wszystkich reguł *wyprowadzalnych* ze względu na  $X$  i  $\mathcal{R}$  definiujemy następująco:

$R \in Der(\mathcal{R}, X)$  wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego  $P \subseteq F$  oraz każdej  $\psi \in F$ : jeśli  $(P, \psi) \in R$ , to  $\psi \in C_{\mathcal{R}}(X \cup P)$ .

- Reguła  $R$  jest zatem dopuszczalna ze względu na  $X$  oraz  $\mathcal{R}$  wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór  $C_{\mathcal{R}}(X)$  jest domknięty na tę regułę.
- $Der(\mathcal{R}, X) \subseteq Adm(\mathcal{R}, X)$ .

# Chińskie mundurki

Niech  $e : V \rightarrow X$  będzie odwzorowaniem ze zbioru  $V$  zmiennych zdaniowych w zbiór formuł  $X$ . Funkcję  $e$  można jednoznacznie rozszerzyć do  $h^e : F \rightarrow F$  w następujący sposób:

$$h^e(p_i) = e(p_i)$$

$$h^e(\xi_j^1(\varphi)) = \xi_j^1(h^e(\varphi)) \text{ (dla spójników 1-argumentowych } \xi_j^1)$$

$$h^e(\xi_j^2(\varphi, \psi)) = \xi_j^2(h^e(\varphi), h^e(\psi)) \text{ (dla spójników 2-argumentowych } \xi_j^2).$$

Reguła *podstawiania za zmienne zdaniowe*:  $\psi$  powstaje z  $\varphi$  przez podstawienie (formuł ze zbioru  $X$  za zmienne zdaniowe) wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje funkcja  $e : V \rightarrow X$  taka, że  $\psi = h^e(\varphi)$ .

Reguła  $R$  jest regułą *strukturalną* w  $F$  wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej pary  $(P, \psi) \in R$  oraz każdego  $e : V \rightarrow F$  mamy  $(h^e[P], h^e(\psi)) \in R$ .

Reguła strukturalna to zatem, intuicyjnie mówiąc, reguła zawierająca wszelkie pary  $(P, \psi)$  będące podstawieniami jakiegokolwiek pary z tej reguły.

# Drobinka semantyki

Niech  $\mathfrak{M} = \langle U, \{f_i\}_{i \in I}, D \rangle$  będzie matrycą logiczną, gdzie  $\langle U, \{f_i\}_{i \in I} \rangle$  jest algebrą podobną do algebry języka  $J = \langle V, \{\xi_i : i \in I\}, F \rangle$ , a  $D$  jest podzbiorem  $U$  (zbiorem wartości wyróżnionych matrycy  $\mathfrak{M}$ ).

Zawartością (zbiorem *tautologii*) matrycy  $\mathfrak{M}$  jest zbiór  $E(\mathfrak{M})$  wszystkich formuł  $\psi$  języka  $J$  takich, że dla dowolnego  $v : V \rightarrow U$  mamy  $h^v(\psi) \in D$ .

Zdefiniujemy funkcję  $C_{\mathfrak{M}} : \wp(F) \rightarrow \wp(F)$  następująco:

- $C_{\mathfrak{M}}(X)$  jest zbiorem wszystkich formuł  $\psi \in F$  takich, że dla dowolnego  $v : V \rightarrow U$  mamy: jeśli  $h^v[X] \subseteq D$ , to  $h^v(\psi) \in D$ .

Wtedy funkcja  $C_{\mathfrak{M}}$  spełnia warunki (C 1)–(C 4). Funkcję  $C_{\mathfrak{M}}$  nazywamy *konsekwencją matrycową* (wyznaczoną przez matrycę  $\mathfrak{M}$ ).

W tych wykładach zajmujemy się syntaktycznymi metodami dowodzenia. Zachowamy jednak czujność semantyczną.

## Co ujrzała Alicja

Niech  $C$  będzie operacją konsekwencji. Zdefiniujmy operację  $C^{-1}$  konsekwencji *odrzucającej* (wyznaczonej przez  $C$ ) następująco:

$$C^{-1}(X) = \{\psi \in F : X \cap C(\{\psi\}) \neq \emptyset\}.$$

Wtedy  $C^{-1}$  spełnia warunki (C1)–(C4).

W myśl powyższej definicji,  $\psi$  jest formułą odrzuconą na gruncie założeń  $X$  wtedy i tylko wtedy, gdy co najmniej jedna formuła z  $X$  jest wyprowadzalna z  $\{\psi\}$ .

Tak więc, formuła  $\psi$  *nie jest* odrzucona na gruncie założeń  $X$  wtedy i tylko wtedy, gdy *żadna* formuła z  $X$  nie jest wyprowadzalna z  $\{\psi\}$ .

Konsekwencje odrzucające możemy charakteryzować poprzez *reguły odrzucania* formuł. Dla przykładu, jedną z takich reguł jest *reguła odrzucania przez odrywanie*: jeśli uznajesz implikację oraz odrzucasz jej następnik, to *odrzuć* jej poprzednik.



# Kraty

Definicja algebraiczna.

Układ  $(A, \cap, \cup)$  nazywamy *kratą*, jeśli  $\cap$  oraz  $\cup$  są dwuargumentowymi operacjami na zbiorze  $A$ , spełniającymi następujące warunki:

$$\begin{array}{ll} x \cup y = y \cup x & x \cap y = y \cap x \\ x \cup (y \cup z) = (x \cup y) \cup z & x \cap (y \cap z) = (x \cap y) \cap z \\ (x \cap y) \cup x = x & x \cap (x \cup y) = x \end{array}$$

Definicja porządkowa.

Częściowy porządek  $\leq$  nazywamy porządkiem *kratowym* w zbiorze  $A$ , jeśli dla każdych  $x, y \in A$  w zbiorze  $A$  istnieją kresy:  $\inf\{x, y\}$  oraz  $\sup\{x, y\}$ . Jeśli  $\leq$  jest porządkiem kratowym w  $A$ , to  $(A, \leq)$  nazywamy *kratą*.

Definicje te są równoważne:

$$\inf\{x, y\} = x \cap y, \sup\{x, y\} = x \cup y, x \leq y \text{ wttw } x \cap y = x \text{ wttw } x \cup y = y$$

# Kraty dystrybutywne

- Największy element kraty (o ile istnieje), nazywamy *jedynką* kraty i oznaczamy np. przez **1**.
- Najmniejszy element kraty (o ile istnieje), nazywamy *zerem* kraty i oznaczamy np. przez **0**.

Krata  $(A, \cap, \cup)$  jest:

- *modularna*, gdy dla wszystkich  $x, y, z$ : jeśli  $x \leq y$ , to  $x \cup (y \cap z) = y \cap (x \cup z)$
- *dystrybutywna*, gdy dla wszystkich  $x, y, z$ :

$$x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z)$$

$$x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z).$$

# Algebry Heytinga

Mówimy, że krata  $(A, \cap, \cup)$  jest *implikatywna*, gdy dla każdych  $x, y \in A$  istnieje  $u \in A$  taki, że dla każdego  $v \in A$ :  $v \leq u$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $x \cap v \leq y$ .

Element ten oznaczany jest np. symbolem  $x \Rightarrow y$ . Wprost z definicji widać, że  $x \Rightarrow y$  jest elementem największym w zbiorze  $\{z \in A : x \cap z \leq y\}$ .

Element  $x \Rightarrow y$  nazywany jest *pseudouzupelnieniem  $x$  względem  $y$* .

Kratę implikatywną, w której istnieje zero  $\mathbf{0}$  nazywamy *kratą Heytinga* (albo *algebrą Heytinga*, albo *algebrą pseudoboole'owską*).

W każdej kratce Heytinga zdefiniować można *pseudouzupelnienie* dowolnego elementu  $x$ , oznaczane np. symbolem  $-x$ , w następujący sposób:  $-x = x \Rightarrow \mathbf{0}$ .

# Algebry Heytinga

Prosty przykład algebry Heytinga podają poniższe tabelki określające wartości operacji  $\cap$ ,  $\cup$  oraz  $\Rightarrow$  w trójelementowym zbiorze liniowo uporządkowanym  $\{0, a, 1\}$  ( $0 \leq a \leq 1$ ):

$\cap$	0	$a$	1
0	0	0	0
$a$	0	$a$	$a$
1	0	$a$	1

$\cup$	0	$a$	1
0	0	$a$	1
$a$	$a$	$a$	1
1	1	1	1

$\Rightarrow$	0	$a$	1
0	1	1	1
$a$	0	1	1
1	0	$a$	1

$x$	$-x$
0	1
$a$	0
1	0

Z tabelek tych widać, że  $-x = 0$  dla wszystkich  $x \neq 0$ . Zauważmy też, że w algebrze tej nie zachodzi np.:  $x \cup -x = 1$ , ponieważ  $a \cup -a = a \cup (a \Rightarrow 0) = a \cup 0 = a \neq 1$ . Ponadto, w algebrze tej nie zachodzi np. prawo Peirce'a: element  $((x \Rightarrow y) \Rightarrow x) \Rightarrow x$  nie musi być równy  $1$ .

## Krata Riegera-Nishimury



Wolna algebra Heytinga o jednym generatorze (zjedzona w Krakowie).

## Algebry Boole'a

Mówimy, że krata  $(A, \cap, \cup)$  jest *komplementarna*, gdy ma ona elementy  $\mathbf{0}$  oraz  $\mathbf{1}$  i gdy dla dowolnego  $x \in A$  istnieje  $y \in A$  taki, że:  $x \cap y = \mathbf{0}$  oraz  $x \cup y = \mathbf{1}$ . W każdej dystrybutywnej kratce komplementarnej dla każdego elementu  $x$  istnieje dokładnie jeden element  $y$ , spełniający te warunki: nazywamy go *uzupełnieniem* elementu  $x$  i oznaczamy  $-x$ .

Można na kilka sposobów definiować algebry Boole'a. *Algebrą Boole'a* nazywamy każdą implikatywną kratę komplementarną. Można też zdefiniować *algebrę Boole'a* jako kratę  $(A, \cup, \cap, -, \mathbf{0}, \mathbf{1})$ , gdzie:

- $(A, \cup, \cap)$  jest kratą dystrybutywną
- $x \cup \mathbf{0} = x$ ,  $x \cap \mathbf{1} = x$ ,  $x \cup -x = \mathbf{1}$ ,  $x \cap -x = \mathbf{0}$ .

W myśl tej definicji, algebra Boole'a to krata dystrybutywna z zerem i jedyką, w której każdy element ma uzupełnienie.

# Algebry Boole'a

Słuchacze z pewnością znają co najmniej dwa przykłady algebr Boole'a:

- Dwoelementowa algebra wartości logicznych.
  - Algebra wszystkich podzbiorów dowolnego zbioru.
- 
- Każda algebra Boole'a jest izomorficzna z pewnym ciałem zbiorów.
  - Algebry Heytinga związane są z logiką intuicjonistyczną.
  - Logiki modalne związane są z algebrami Boole'a z dodatkowymi operacjami.

W trakcie wykładów będziemy sporadycznie korzystać z podanych pojęć algebraicznych (a także dalszych, jak np.: filtr, kongruencja, algebra ilorazowa).