

DODATEK 2:
DOWODY NIEKTÓRYCH TWIERDZEŃ
DOTYCZĄCYCH
AKSJOMATYCZNEGO UJĘCIA
KLASYCZNEGO RACHUNKU ZDAŃ

Twierdzenie 5.1. Formuła α jest wyprowadzalna ze zbioru formuł X wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje skończony ciąg formuł $\langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \rangle$ taki, że α jest identyczna z β_n , a dowolny element ciągu $\langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \rangle$:

- jest elementem zbioru X , **albo**
- jest tezą KRZ, **albo**
- powstał z wyrazów wcześniejszych w tym ciągu w wyniku zastosowania reguły odrywania lub dowolnej reguły wyprowadzalnej w KRZ.

DOWÓD.

Należy pokazać, że zachodzi zarówno implikacja prosta, jak i odwrotna, dające łącznie tezę twierdzenia.

Dowód implikacji \Rightarrow jest oczywisty, ponieważ każdy aksjomat KRZ jest tezą KRZ, na mocy definicji pojęć: tezy i dowodu.

Dla dowodu implikacji \Leftarrow załóżmy, że istnieje skończony ciąg

$$B = \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \rangle$$

taki, że α jest identyczna z β_n oraz każdy element ciągu B :

- jest elementem zbioru X , **albo**
- jest tezą KRZ, **albo**
- powstał z wyrazów wcześniejszych w tym ciągu w wyniku zastosowania reguły odrywania RO lub dowolnej reguły wyprowadzalnej w KRZ.

Trzeba pokazać, że $X \vdash_{krz} \alpha$, czyli że α ma dowód w KRZ w oparciu o zbiór założeń X .

Budujemy ciąg

$$\Gamma = \langle \gamma_1^1, \gamma_1^2, \dots, \gamma_1^{k_1}, \gamma_2^1, \gamma_2^2, \dots, \gamma_2^{k_2}, \dots, \gamma_n^1, \gamma_n^2, \dots, \gamma_n^{k_n} \rangle$$

taki, że $\gamma_n^{k_n}$ jest identyczna z β_n (a więc $\gamma_n^{k_n}$ jest identyczna z α) oraz dla każdego $1 \leq i \leq n$ spełnione są warunki:

- jeśli $\beta_i \in X$, to $k_i = 1$ oraz $\gamma_i^1 = \beta_i$
- jeśli β_i jest tezą, to ciąg $\langle \gamma_i^1, \gamma_i^2, \dots, \gamma_i^{k_i} \rangle$ jest dowodem β_i (w oparciu o zbiór aksjomatów Ax oraz regułę odrywania RO)
- jeśli β_i powstaje z wyrazów wcześniejszych w ciągu B poprzez zastosowanie reguły odrywania RO, to $k_i = 1$ oraz $\gamma_i^1 = \beta_i$
- jeśli β_i powstaje z wyrazów wcześniejszych w ciągu B poprzez zastosowanie jakiejś reguły wyprowadzalnej (Y, β_i) , to ciąg $\langle \gamma_i^1, \gamma_i^2, \dots, \gamma_i^{k_i} \rangle$ jest wyprowadzeniem tej reguły w KRZ (w oparciu o aksjomaty Ax oraz regułę odrywania RO); w tym przypadku wszystkie elementy zbioru Y są elementami ciągu B .

Tak skonstruowany ciąg Γ jest dowodem formuły α w oparciu o aksjomaty Ax , założenia X oraz regułę odrywania RO. Pokazaliśmy więc, że $X \vdash_{krz} \alpha$.

Q.E.D.

Twierdzenie 5.2. Dla dowolnych zbiorów formuł X, Y, Z oraz dowolnej formuły α zachodzą następujące warunki:

- (1) \vdash_{krz} jest zwrotna: $X \vdash_{krz} X$
- (2) \vdash_{krz} jest przechodnia: jeśli $X \vdash_{krz} Y$ oraz $Y \vdash_{krz} Z$, to $X \vdash_{krz} Z$
- (3) \vdash_{krz} jest monotoniczna względem pierwszego argumentu:
jeśli $X \vdash_{krz} Y$ oraz $X \subseteq Z$, to $Z \vdash_{krz} Y$
- (4) \vdash_{krz} jest antymonotoniczna względem drugiego argumentu:
jeśli $X \vdash_{krz} Y$ oraz $Z \subseteq Y$, to $X \vdash_{krz} Z$
- (5) $\emptyset \vdash_{krz} \alpha$ wtedy i tylko wtedy, gdy α jest tezą KRZ.

DOWÓD.

(1) Niech $\alpha \in X$. Wtedy ciąg jednoelementowy $\langle \alpha \rangle$ jest dowodem α z X , a więc $X \vdash_{krz} \alpha$. Ponieważ α była dowolnym elementem zbioru X , otrzymujemy: $X \vdash_{krz} X$.

(2) Załóżmy, że $X \vdash_{krz} Y$ oraz $Y \vdash_{krz} Z$. Musimy pokazać, że $X \vdash_{krz} \alpha$ dla dowolnej $\alpha \in Z$. Niech zatem $\alpha \in Z$. Ponieważ $Y \vdash_{krz} Z$, więc mamy $Y \vdash_{krz} \alpha$. Istnieje zatem dowód α z Y , czyli ciąg $B = \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \rangle$ taki, że α jest identyczna z β_n oraz każdy element ciągu B :

- jest elementem zbioru Y , **albo**
- jest aksjomatem KRZ, **albo**
- powstał z wyrazów wcześniejszych w tym ciągu w wyniku zastosowania reguły odrywania.

Ponieważ $X \vdash_{krz} Y$, więc każdy element zbioru Y ma dowód w oparciu o założenia X . Skonstruujemy teraz nowy ciąg Γ (będący dowodem α z X), zastępując w ciągu B elementy ze zbioru Y ich dowodami z X :

$$\Gamma = \langle \gamma_1^1, \gamma_1^2, \dots, \gamma_1^{k_1}, \gamma_2^1, \gamma_2^2, \dots, \gamma_2^{k_2}, \dots, \gamma_n^1, \gamma_n^2, \dots, \gamma_n^{k_n} \rangle,$$

gdzie dla wszystkich $1 \leq i \leq n$:

- jeśli $\beta_i \in Y$, to $\langle \gamma_i^1, \gamma_i^2, \dots, \gamma_i^{k_i} \rangle$ jest dowodem β_i ze zbioru Y (a zatem β_i jest identyczna z $\gamma_i^{k_i}$)
- jeśli β_i jest aksjomatem, to $k_i = 1$ oraz $\gamma_i^{k_i}$ jest identyczna z β_i
- jeśli β_i powstała z wyrazów wcześniejszych w ciągu B poprzez zastosowanie reguły odrywania RO, to $k_i = 1$ oraz $\gamma_i^{k_i}$ jest identyczna z β_i .

Z określenia ciągu Γ widać, że:

- α jest identyczna z $\gamma_n^{k_n}$
- każdy element ciągu Γ jest bądź aksjomatem, bądź elementem zbioru X , bądź powstaje z formuł wcześniejszych w Γ poprzez zastosowanie reguły odrywania RO.

Tak więc, Γ jest dowodem α z X , czyli $X \vdash_{krz} \alpha$. Ostatecznie więc $X \vdash_{krz} Z$.

(3) Załóżmy, że $X \vdash_{krz} Y$ oraz $X \subseteq Z$. Trzeba pokazać, że $Z \vdash_{krz} Y$, czyli że każdy element zbioru Y jest wyprowadzalny z Z . Niech $\alpha \in Y$. Ponieważ $X \vdash_{krz} Y$ więc istnieje ciąg $B = \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \rangle$ będący wyprowadzeniem α z X . Każdy element ciągu B jest bądź aksjomatem, bądź elementem zbioru X , bądź powstaje z formuł wcześniejszych w B poprzez zastosowanie reguły odrywania RO. Ponieważ $X \subseteq Z$, więc ciąg B jest także wyprowadzeniem α z Z , czyli $Z \vdash_{krz} \alpha$. Pokazaliśmy zatem, że $Z \vdash_{krz} Y$.

(4) Załóżmy, że $X \vdash_{krz} Y$ oraz $Z \subseteq Y$. Trzeba pokazać, że $X \vdash_{krz} Z$, czyli że każdy element zbioru Z jest wyprowadzalny z X . Niech $\alpha \in Z$. Ponieważ mamy $Z \subseteq Y$, więc $\alpha \in Y$. Z założenia mamy $X \vdash_{krz} Y$, a zatem $X \vdash_{krz} \alpha$. Pokazaliśmy w ten sposób, że $X \vdash_{krz} Z$.

(5) Wynika wprost z definicji tezy KRZ oraz relacji \vdash_{krz} .

Q.E.D.

Twierdzenie 5.3. TWIERDZENIE O DEDUKCJI WPROST (wersja syntaktyczna).

Dla dowolnego zbioru formuł X oraz formuł α, β zachodzą implikacje:

- (a) Jeśli $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \beta$, to $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \beta$.
- (b) Jeśli $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \beta$, to $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \beta$.

DOWÓD.

Dowód implikacji (a).

Założmy, że $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \beta$. Pokażemy, że $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \beta$.

Z założenia, istnieje skończony ciąg $\Gamma = \langle \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n \rangle$ taki, że:

- β jest identyczna z γ_n
- każdy element Γ jest bądź elementem zbioru $X \cup \{\alpha\}$, bądź aksjomatem opartym na którymś ze schematów (A1)–(A13), bądź powstaje z wyrazów wcześniejszych w Γ poprzez zastosowanie reguły odrywania RO.

Konstruujemy ciąg

$$\Delta = \langle \alpha \rightarrow \gamma_1, \alpha \rightarrow \gamma_2, \dots, \alpha \rightarrow \gamma_n \rangle.$$

Pokażemy, że wszystkie elementy ciągu Δ są wyprowadzalne z X , tj. że $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_i$ dla wszystkich $1 \leq i \leq n$.

Dowód będzie wykorzystywał metodę indukcji matematycznej, znaną każdemu ze szkoły. Tak więc, pokażemy, że:

- (I) $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_1$ (początkowy krok indukcji)
- (II) $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_i$ dla $i \leq k$, gdzie $k < n$ implikuje $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_{k+1}$ (następnikowy krok indukcji).

Z (I) oraz (II) otrzymujemy, na mocy zasady indukcji matematycznej:

$$X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_n,$$

czyli tezę twierdzenia 5.3.(a) (ponieważ γ_n jest identyczna z β).

Dowód punktu (I). Należy rozpatrzyć dwa przypadki:

- I.1. γ_1 jest założeniem, czyli $\gamma_1 \in X \cup \{\alpha\}$
- I.2. γ_1 jest aksjomatem opartym na jednym ze schematów (A1)–(A13).

Przypadek I.1. Jeśli $\gamma_1 \in X \cup \{\alpha\}$, to zachodzi jedno z dwojga:

- I.1.1. $\gamma_1 \in X$
- I.1.2. $\gamma_1 \in \{\alpha\}$, tj. γ_1 jest identyczna z α .

Należy zatem rozważyć każdy z tych podprzypadków.

Podprzypadek I.1.1. Jeśli $\gamma_1 \in X$, to $X \vdash_{krz} \gamma_1$, na mocy zwrotności oraz monotoniczności relacji \vdash_{krz} . Mamy również: $X \vdash_{krz} \gamma_1 \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma_1)$, ponieważ:

- $\gamma_1 \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma_1)$ otrzymujemy ze schematu (A3): α/γ_1 , β/α ; a zatem $\emptyset \vdash_{krz} \gamma_1 \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma_1)$
- skoro $\gamma_1 \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma_1)$ jest wyprowadzalna ze zbioru pustego, to (na mocy monotoniczności relacji \vdash_{krz}) jest ona wyprowadzalna ze zbioru X .

Mamy zatem $X \vdash_{krz} \{\gamma_1, \gamma_1 \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma_1)\}$. Ponieważ (na mocy reguły odrywania) mamy $\{\gamma_1, \gamma_1 \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma_1)\} \vdash \alpha \rightarrow \gamma_1$, więc (na mocy przechodności relacji \vdash_{krz}) mamy również: $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_1$.

Podprzypadek I.1.2. Jeśli γ_1 jest identyczna z α , pozostaje do udowodnienia, że $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \alpha$. Formuła $\alpha \rightarrow \alpha$ jest tezą (teza (T1)), a zatem $\emptyset \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \alpha$. Stąd, na mocy monotoniczności relacji \vdash_{krz} , mamy $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \alpha$.

Przypadek I.2. Jeśli γ_1 jest aksjomatem, to jest też tezą, czyli $\emptyset \vdash_{krz} \gamma_1$. Podobnie jak w I.1.1., mamy: $\emptyset \vdash_{krz} \gamma_1 \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma_1)$. Mamy zatem:

$$\emptyset \vdash_{krz} \{\gamma_1, \gamma_1 \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma_1)\}.$$

Ponieważ (na mocy reguły odrywania) mamy:

$$\{\gamma_1, \gamma_1 \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma_1)\} \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_1,$$

więc (na mocy przechodniości relacji \vdash_{krz}) mamy również: $\emptyset \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_1$. Wreszcie, z monotoniczności relacji \vdash_{krz} , mamy: $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_1$.

Dowód punktu (II). Przyjmujemy założenie indukcyjne, to znaczy zakładamy, że $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_i$ dla $i \leq k$, gdzie $k < n$. Trzeba pokazać, że $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_{k+1}$. Możliwe są trzy przypadki:

- II.1. γ_{k+1} jest założeniem, czyli $\gamma_{k+1} \in X \cup \{\alpha\}$
- II.2. γ_{k+1} jest aksjomatem opartym na jednym ze schematów (A1)–(A13)
- II.3. γ_{k+1} powstaje z wyrazów wcześniejszych w ciągu Γ poprzez zastosowanie reguły odrywania RO.

W przypadkach II.1. oraz II.2. postępujemy analogicznie, jak w dowodzie punktu I (pisząc γ_{k+1} w miejsce γ_1).

Mamy więc w tych przypadkach: $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_{k+1}$.

Trzeba jeszcze rozważyć przypadek II.3. Jeśli γ_{k+1} powstaje z wyrazów wcześniejszych w ciągu Γ poprzez zastosowanie reguły odrywania RO, to istnieją elementy $\gamma_{m_1}, \gamma_{m_2}$ ciągu Γ takie, że $m_1 \leq k, m_2 \leq k$ oraz zachodzi jeden z dwóch przypadków:

- γ_{m_1} jest identyczna z $\gamma_{m_2} \rightarrow \gamma_{k+1}$, **albo**
- γ_{m_2} jest identyczna z $\gamma_{m_1} \rightarrow \gamma_{k+1}$.

Ponieważ γ_{m_1} oraz γ_{m_2} są wcześniejsze w ciągu Γ od γ_{k+1} , więc na mocy założenia indukcyjnego mamy:

- $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_{m_1}$ **oraz**
- $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_{m_2}$.

Ma miejsce zatem jeden z dwóch przypadków:

- $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow (\gamma_{m_1} \rightarrow \gamma_{k+1})$ i $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_{m_1}$ **lub**
- $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow (\gamma_{m_2} \rightarrow \gamma_{k+1})$ i $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_{m_2}$.

Stąd otrzymujemy:

- $X \vdash_{krz} \{\alpha \rightarrow (\gamma_{m_1} \rightarrow \gamma_{k+1}), \alpha \rightarrow \gamma_{m_1}\}$ **lub**
- $X \vdash_{krz} \{\alpha \rightarrow (\gamma_{m_2} \rightarrow \gamma_{k+1}), \alpha \rightarrow \gamma_{m_2}\}$.

Zastosowanie reguły sylogizmu Fregego do tych przypadków daje:

- $\{\alpha \rightarrow (\gamma_{m_1} \rightarrow \gamma_{k+1}), \alpha \rightarrow \gamma_{m_1}\} \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_{k+1}$
- $\{\alpha \rightarrow (\gamma_{m_2} \rightarrow \gamma_{k+1}), \alpha \rightarrow \gamma_{m_2}\} \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_{k+1}$.

Na mocy przechodniości relacji \vdash_{krz} , w każdym z tych przypadków otrzymujemy $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_{k+1}$, co stanowi dowód następnikowego kroku indukcji.

Ostatecznie:

$$X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma_n,$$

(ponieważ γ_n jest identyczna z β), czyli udowodniliśmy tezę twierdzenia 5.3.(a).

Dowód implikacji (b).

Założmy, że $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \beta$. Trzeba pokazać, że $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \beta$. Na mocy monotoniczności relacji \vdash_{krz} (twierdzenie 5.2.(3)), skoro $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \beta$, to także $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \beta$. Ze zwrotności relacji \vdash_{krz} (twierdzenie 5.2.(1)) mamy $\{\alpha\} \vdash_{krz} \alpha$. Stąd, ponownie na mocy monotoniczności relacji \vdash_{krz} , mamy $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \alpha$. To łącznie daje $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \{\alpha \rightarrow \beta, \alpha\}$.

Ponieważ $\{\alpha \rightarrow \beta, \alpha\} \vdash_{krz} \beta$, więc na mocy przechodniości relacji \vdash_{krz} (twierdzenie 5.2.(2)), otrzymujemy $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \beta$.

Q.E.D.

Twierdzenie 5.4. TWIERDZENIE O DEDUKCJI NIE WPROST (wersja syntaktyczna).

Dla dowolnego zbioru formuł X oraz formuły α zachodzą równoważności:

- (1) $X \vdash_{krz} \neg\alpha$ wtedy i tylko wtedy, gdy:
istnieje formuła β taka, że $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \{\beta, \neg\beta\}$.
- (2) $X \vdash_{krz} \alpha$ wtedy i tylko wtedy, gdy:
istnieje formuła β taka, że $X \cup \{\neg\alpha\} \vdash_{krz} \{\beta, \neg\beta\}$.

DOWÓD.

Trzeba udowodnić cztery implikacje (implikację prostą i odwrotną dla każdego z obu punktów twierdzenia).

Dowód 5.4.1.

Dowód 5.4.1. \Rightarrow

Założmy, że $X \vdash_{krz} \neg\alpha$. Na mocy monotoniczności relacji \vdash_{krz} mamy: $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \neg\alpha$. Na mocy zwrotności relacji \vdash_{krz} mamy: $\{\alpha\} \vdash_{krz} \alpha$, a z monotoniczności relacji \vdash_{krz} mamy: $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \alpha$. Stąd: $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \{\alpha, \neg\alpha\}$. Pokazaliśmy zatem, że ze zbioru $X \cup \{\alpha\}$ wyprowadzić można parę formuł wzajemnie sprzecznych, co kończy dowód 5.4.1. \Rightarrow .

Dowód 5.4.1. \Leftarrow

Założmy, że istnieje formuła β taka, że $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \{\beta, \neg\beta\}$.

Wtedy: $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \beta$ oraz $X \cup \{\alpha\} \vdash_{krz} \neg\beta$. Z twierdzenia o dedukcji wprost mamy: $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \beta$ oraz $X \vdash_{krz} \alpha \rightarrow \neg\beta$, czyli:

$$X \vdash_{krz} \{\alpha \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \neg\beta\}.$$

Mamy także: $\{\alpha \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \neg\beta\} \vdash_{krz} \neg\alpha$, ponieważ:

- | | |
|---|-----------|
| 1. $\alpha \rightarrow \beta$ | założenie |
| 2. $\alpha \rightarrow \neg\beta$ | założenie |
| 3. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow \neg\alpha)$ | (T11) |
| 4. $(\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow \neg\alpha$ | RO: 3,1 |
| 5. $\neg\alpha$ | RO: 4,2. |

Z $X \vdash_{krz} \{\alpha \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \neg\beta\}$ oraz $\{\alpha \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \neg\beta\} \vdash_{krz} \neg\alpha$, na mocy przechodniości relacji \vdash_{krz} , mamy: $X \vdash_{krz} \neg\alpha$, co kończy dowód 5.4.1. \Leftarrow .

Dowód 5.4.2.**Dowód 5.4.2.** \Rightarrow

Założmy, że $X \vdash_{krz} \alpha$. Trzeba pokazać, że istnieje formuła β taka, że

$$X \cup \{\neg\alpha\} \vdash_{krz} \{\beta, \neg\beta\}.$$

Z monotoniczności relacji \vdash_{krz} mamy: $X \cup \{\neg\alpha\} \vdash_{krz} \alpha$. Na mocy zwrotności relacji \vdash_{krz} mamy: $\{\neg\alpha\} \vdash_{krz} \neg\alpha$, a z monotoniczności relacji \vdash_{krz} mamy: $X \cup \{\neg\alpha\} \vdash_{krz} \neg\alpha$. Stąd: $X \cup \{\neg\alpha\} \vdash_{krz} \{\alpha, \neg\alpha\}$. Pokazaliśmy zatem, że ze zbioru $X \cup \{\neg\alpha\}$ wyprowadzić można parę formuł wzajemnie sprzecznych, co kończy dowód 5.4.2. \Rightarrow .

Dowód 5.4.2. \Leftarrow

Założmy, że istnieje formuła β taka, że $X \cup \{\neg\alpha\} \vdash_{krz} \{\beta, \neg\beta\}$. Trzeba pokazać, że $X \vdash_{krz} \alpha$.

Z założenia mamy: $X \cup \{\neg\alpha\} \vdash_{krz} \beta$ oraz $X \cup \{\neg\alpha\} \vdash_{krz} \neg\beta$. Z twierdzenia o dedukcji wprost mamy: $X \vdash_{krz} \neg\alpha \rightarrow \beta$ oraz $X \vdash_{krz} \neg\alpha \rightarrow \neg\beta$, czyli $X \vdash_{krz} \{\neg\alpha \rightarrow \beta, \neg\alpha \rightarrow \neg\beta\}$. Mamy także: $\{\neg\alpha \rightarrow \beta, \neg\alpha \rightarrow \neg\beta\} \vdash_{krz} \alpha$, ponieważ:

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | $\neg\alpha \rightarrow \beta$ | założenie |
| 2. | $\neg\alpha \rightarrow \neg\beta$ | założenie |
| 3. | $(\neg\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\neg\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow \neg\neg\alpha)$ | (T11): $\alpha/\neg\alpha$ |
| 4. | $(\neg\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow \neg\neg\alpha$ | RO: 3,1 |
| 5. | $\neg\neg\alpha$ | RO: 4,2 |
| 6. | $\neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$ | (T4) |
| 7. | α | RO: 6,5. |

Z $X \vdash_{krz} \{\alpha \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \neg\beta\}$ oraz $\{\alpha \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \neg\beta\} \vdash_{krz} \alpha$, na mocy przechodniości relacji \vdash_{krz} , mamy: $X \vdash_{krz} \alpha$, co kończy dowód 5.4.2. \Leftarrow .

Q.E.D.

Twierdzenie 5.5. Relacja inferencyjnej równoważności formuł \approx ma następujące własności:

- (a) \approx jest relacją równoważności w zbiorze F_{KRZ} .
- (b) Jeśli $\alpha \approx \beta$ i α jest tezą KRZ, to także β jest tezą KRZ.
- (c) Dla dowolnych formuł $\alpha, \beta, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$:

- (c1) jeśli $\alpha \approx \beta$, to $\neg\alpha \approx \neg\beta$,
 - (c2) jeśli $\alpha_1 \approx \beta_1$ i $\alpha_2 \approx \beta_2$, to $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \approx \beta_1 \wedge \beta_2$,
 - (c3) jeśli $\alpha_1 \approx \beta_1$ i $\alpha_2 \approx \beta_2$, to $\alpha_1 \vee \alpha_2 \approx \beta_1 \vee \beta_2$,
 - (c4) jeśli $\alpha_1 \approx \beta_1$ i $\alpha_2 \approx \beta_2$, to $\alpha_1 \rightarrow \alpha_2 \approx \beta_1 \rightarrow \beta_2$,
 - (c5) jeśli $\alpha_1 \approx \beta_1$ i $\alpha_2 \approx \beta_2$, to $\alpha_1 \equiv \alpha_2 \approx \beta_1 \equiv \beta_2$.
- (d) Dla dowolnych formuł α, β :
 - (d1) jeśli α i β są alternatywami elementarnymi, to istnieje alternatywa elementarna γ taka, że $\alpha \vee \beta \approx \gamma$,
 - (d2) jeśli α i β są w kpn, to istnieje formuła γ w kpn taka, że $\alpha \wedge \beta \approx \gamma$,
 - (d3) jeśli α jest w kpn, a β jest alternatywą elementarną, to istnieje formuła γ w kpn taka, że $\alpha \vee \beta \approx \gamma$,
 - (d4) jeśli α i β są w kpn, to istnieje formuła γ w kpn taka, że $\alpha \vee \beta \approx \gamma$,
 - (d5) jeśli α jest alternatywą elementarną, to istnieje formuła γ w kpn taka, że $\neg\alpha \approx \gamma$,
 - (d6) jeśli α jest w kpn, to istnieje formuła γ w kpn taka, że $\neg\alpha \approx \gamma$.
 - (e) Każda formuła jest inferencyjnie równoważna pewnej formule w kpn (koniunkcyjnej postaci normalnej).
 - (f) Każda formuła jest inferencyjnie równoważna pewnej formule w apn (alternatywnej postaci normalnej).

DOWÓD. (Szkic.)

(a) Dla dowodu, że \approx jest relacją równoważności w zbiorze F_{KRZ} trzeba pokazać, że jest to relacja: zwrotna, symetryczna oraz przechodnia. Oznacza to, iż musimy wykazać, że dla dowolnych formuł α, β oraz γ :

- (a1) $\vdash_{krz} \alpha \equiv \alpha$
- (a2) jeśli $\vdash_{krz} \alpha \equiv \beta$, to $\vdash_{krz} \beta \equiv \alpha$
- (a3) jeśli $\vdash_{krz} \alpha \equiv \beta$ oraz $\vdash_{krz} \beta \equiv \gamma$, to $\vdash_{krz} \alpha \equiv \gamma$.

Punkt **(a1)** wynika bezpośrednio z tezy (T1) oraz aksjomatu (A12). Zatem relacja \approx jest zwrotna.

Punkt **(a2)** wynika z faktu, że $(\alpha \equiv \beta) \rightarrow (\beta \equiv \alpha)$ jest tezą KRZ:

- | | | |
|----|---|------------------------------------|
| 1. | $(\alpha \equiv \beta)$ | założenie |
| 2. | $(\alpha \equiv \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$ | (A10) |
| 3. | $(\alpha \equiv \beta) \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$ | (A11) |
| 4. | $\alpha \rightarrow \beta$ | RO: 2,1 |
| 5. | $\beta \rightarrow \alpha$ | RO: 3,1 |
| 6. | $(\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\beta \equiv \alpha))$ | (A12) $\alpha/\beta, \beta/\alpha$ |
| 7. | $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\beta \equiv \alpha)$ | RO: 6,5 |
| 8. | $\beta \equiv \alpha$ | RO: 7,4. |

Założmy, że $\vdash_{krz} \alpha \equiv \beta$. Na mocy powyższego dowodu mamy:

$$\vdash_{krz} (\alpha \equiv \beta) \rightarrow (\beta \equiv \alpha).$$

Ponieważ $\{\alpha \equiv \beta, (\alpha \equiv \beta) \rightarrow (\beta \equiv \alpha)\} \vdash_{krz} \beta \equiv \alpha$, więc otrzymujemy stąd $\vdash_{krz} \beta \equiv \alpha$. Pokazaliśmy zatem, że relacja \approx jest symetryczna.

Dla dowodu **(a3)** założmy, że $\vdash_{krz} \alpha \equiv \beta$ oraz $\vdash_{krz} \beta \equiv \gamma$. Pokażemy najpierw (korzystając z twierdzenia o dedukcji wprost), że wtedy $\vdash_{krz} \alpha \rightarrow \gamma$:

- | | | |
|----|--|------------------------------------|
| 1. | $\alpha \equiv \beta$ | założenie |
| 2. | $\beta \equiv \gamma$ | założenie |
| 3. | α | założenie |
| 4. | $(\alpha \equiv \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$ | (A10) |
| 5. | $\alpha \rightarrow \beta$ | RO: 4,1 |
| 6. | $(\beta \equiv \gamma) \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$ | (A10) $\alpha/\beta, \beta/\gamma$ |
| 7. | $\beta \rightarrow \gamma$ | RO: 6,2 |
| 8. | β | RO: 5,3 |
| 9. | γ | RO: 7,8. |

W analogiczny sposób pokazujemy, że $\vdash_{krz} \gamma \rightarrow \alpha$, a następnie korzystamy z aksjomatu (A12) dla uzyskania $\vdash_{krz} \alpha \equiv \gamma$. Tak więc, relacja \approx jest przechodnia.

(b) Niech $\alpha \approx \beta$ i niech α będzie tezą KRZ. Musimy pokazać, że β także jest tezą KRZ.

Z założenia mamy: $\vdash_{krz} \alpha \equiv \beta$ oraz $\vdash_{krz} \alpha$.

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | $\alpha \equiv \beta$ | założenie |
| 2. | α | założenie |
| 3. | $(\alpha \equiv \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$ | (A10) |
| 4. | $\alpha \rightarrow \beta$ | RO: 3,1 |
| 5. | β | RO: 4,2. |

Pokazaliśmy więc, że $\{\alpha \equiv \beta, \alpha\} \vdash_{krz} \beta$, co kończy dowód punktu **(b)**.

Na marginesie zauważmy, że na wykładzie pokazano wyprowadzalność reguły $\{\alpha \equiv \beta, \beta\} \vdash_{krz} \alpha$:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | $\alpha \equiv \beta$ | założenie |
| 2. | β | założenie |
| 3. | $(\alpha \equiv \beta) \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$ | (A12) |
| 4. | $\beta \rightarrow \alpha$ | RO: 3,1 |
| 5. | α | RO: 4,2. |

(c) Dowód, że \approx ma własności (c1)–(c5) polega na wykazaniu, iż tezami KRZ są:

- $(\alpha \equiv \beta) \rightarrow (\neg\alpha \equiv \neg\beta)$
- $(\alpha_1 \equiv \beta_1) \rightarrow ((\alpha_2 \equiv \beta_2) \rightarrow ((\alpha_1 \wedge \alpha_2) \equiv (\beta_1 \wedge \beta_2)))$
- $(\alpha_1 \equiv \beta_1) \rightarrow ((\alpha_2 \equiv \beta_2) \rightarrow ((\alpha_1 \vee \alpha_2) \equiv (\beta_1 \vee \beta_2)))$
- $(\alpha_1 \equiv \beta_1) \rightarrow ((\alpha_2 \equiv \beta_2) \rightarrow ((\alpha_1 \rightarrow \alpha_2) \equiv (\beta_1 \rightarrow \beta_2)))$
- $(\alpha_1 \equiv \beta_1) \rightarrow ((\alpha_2 \equiv \beta_2) \rightarrow ((\alpha_1 \equiv \alpha_2) \equiv (\beta_1 \equiv \beta_2)))$.

Proponujemy słuchaczom samodzielne wyprowadzenie tych tez.

(d) Dowody własności (d1)–(d6) przeprowadzamy stosując indukcję strukturalną po budowie formuł. Zobacz: BATÓG 1999, 71–82.

(e), (f) Dowody tych punktów, wykorzystujące punkt **(d)**, znajdujemy w podręczniku BATÓG 1999, 82–87. Zobacz też monografię: POGORZELSKI 1975, 85–97.

Przy okazji, przypomnijmy, że tezami KRZ są:

- $(\alpha \equiv \beta) \equiv ((\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha))$
- $(\alpha \rightarrow \beta) \equiv ((\neg\alpha) \vee \beta)$
- $\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \neg\beta)$

- $\neg(\alpha \vee \beta) \equiv (\neg\alpha \wedge \neg\beta)$
- $\neg\neg\alpha \equiv \alpha$
- $(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)) \equiv ((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma))$
- $(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)) \equiv ((\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)).$

Tezy te wykorzystywać można przy przekształcaniu dowolnej formuły do inferencyjnie jej równoważnej formuły w kpn lub w apn.

Q.E.D.

Twierdzenie 5.6. (TWIERDZENIE O TRAFNOŚCI AKSJOMATYKI.) Każda teza KRZ jest tautologią KRZ.

DOWÓD. Niech α będzie tezą KRZ. Musimy pokazać, że α jest tautologią KRZ.

Ponieważ α jest tezą, więc istnieje skończony ciąg $\Gamma = \langle \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n \rangle$ taki, że:

- α jest identyczna z γ_n
- każdy element Γ jest bądź aksjوماتem opartym na którymś ze schematów (A1)–(A13), bądź powstaje z wyrazów wcześniejszych w Γ poprzez zastosowanie reguły odrywania RO.

Pokażemy, stosując indukcję matematyczną, że każdy element ciągu Γ jest tautologią KRZ.

I. *Początkowy krok indukcji.* Pierwszy element ciągu Γ musi być aksjوماتem. Ponieważ każdy aksjomat jest tautologią KRZ (co łatwo sprawdzić), więc γ_1 jest tautologią.

II. *Następnikowy krok indukcji.* Zakładamy, że wszystkie elementy ciągu Γ do miejsca $k < n$ są tautologiami. Musimy pokazać, że γ_{k+1} jest tautologią. Możliwe są dwa przypadki:

- (i) γ_{k+1} jest aksjوماتem
- (ii) γ_{k+1} powstała z wyrazów wcześniejszych w Γ poprzez zastosowanie reguły odrywania RO.

W przypadku (i) γ_{k+1} jest oczywiście tautologią.

W przypadku (ii) istnieją $m_1 \leq k$ oraz $m_2 \leq k$ takie, że:

- γ_{m_1} jest identyczna z $\gamma_{m_2} \rightarrow \gamma_{k+1}$ **lub**
- γ_{m_2} jest identyczna z $\gamma_{m_1} \rightarrow \gamma_{k+1}$.

Z założenia indukcyjnego mamy:

- $\gamma_{m_2} \rightarrow \gamma_{k+1}$ oraz γ_{m_2} są tautologiami **lub**
- $\gamma_{m_1} \rightarrow \gamma_{k+1}$ oraz γ_{m_1} są tautologiami.

Ponieważ reguła odrywania RO zachowuje własność bycia tautologią, więc γ_{k+1} jest tautologią. W szczególności, γ_n jest tautologią. Ponieważ γ_n jest identyczna z α , kończy to dowód twierdzenia.

Q.E.D.

Twierdzenie 5.7. (TWIERDZENIE LINDENBAUMA-ASSERA.)

Dla dowolnego zbioru formuł X oraz formuły α : jeśli $X \not\vdash_{krz} \alpha$, to istnieje zbiór $L^\alpha(X)$ o następujących własnościach:

- (1) $\alpha \notin L^\alpha(X)$
- (2) $X \subseteq L^\alpha(X)$
- (3) dla każdej formuły β : jeśli $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta$, to $\beta \in L^\alpha(X)$
- (4) dla każdej formuły β : jeśli $\beta \notin L^\alpha(X)$, to $L^\alpha(X) \cup \{\beta\} \vdash_{krz} \alpha$.

DOWÓD. Wszystkie formuły języka KRZ możemy ponumerować i ustawić w nieskończony ciąg przeliczalny:

$$\Gamma = \langle \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n, \dots \rangle.$$

Założmy, że $X \not\vdash_{krz} \alpha$. Zdefiniujemy najpierw rodzinę $\mathbb{R} = \{X_i : i \in \mathcal{N}\}$ w sposób następujący:

- $X_1 = \{\beta : X \vdash_{krz} \beta\}$
- jeśli $X_k \cup \{\gamma_k\} \vdash_{krz} \alpha$, to $X_{k+1} = X_k$
- jeśli $X_k \cup \{\gamma_k\} \not\vdash_{krz} \alpha$, to $X_{k+1} = \{\delta : X_k \cup \{\gamma_k\} \vdash_{krz} \delta\}$.

Pokażemy teraz, że wszystkie elementy rodziny \mathbb{R} mają następujące własności:

- (A) $X_k \subseteq X_{k+1}$.
- (B) $\alpha \notin X_k$.
- (C) Dla dowolnej formuły β : jeśli $X_k \vdash_{krz} \beta$, to $\beta \in X_k$.

Dowód (A). Niech $\beta \in X_k$. Pokażemy, że $\beta \in X_{k+1}$. Możliwe są dwa przypadki:

- (a1) $X_k \cup \{\gamma_k\} \vdash_{krz} \alpha$
- (a2) $X_k \cup \{\gamma_k\} \not\vdash_{krz} \alpha$.

W przypadku (a1) mamy: $X_k = X_{k+1}$, a więc $\beta \in X_{k+1}$.

W przypadku (a2) mamy: $X_{k+1} = \{\delta : X_k \cup \{\gamma_k\} \vdash_{krz} \delta\}$. Ponieważ (z założenia) $\beta \in X_k$, więc (ze zwrotności \vdash_{krz}): $X_k \vdash_{krz} \beta$. Zatem (z monotoniczności \vdash_{krz}) mamy: $X_k \cup \{\gamma_k\} \vdash_{krz} \beta$. A to oznacza, że $\beta \in X_{k+1}$.

Dowód (B). Przeprowadzimy dowód metodą nie wprost. Przypuśćmy, że $\alpha \in X_k$, dla pewnego $k \in \mathcal{N}$. Wtedy istnieje najmniejsze takie k , niech będzie nim k_0 . Stąd zbiór X_{k_0} byłby najmniejszym zbiorem w rodzinie \mathbb{R} takim, że $\alpha \in X_{k_0}$. Z założenia mamy $\alpha \notin X_1$, a więc $k_0 > 1$. Oznacza to, że $\alpha \in X_{k_0}$ oraz $\alpha \notin X_{k_0-1}$. Mamy więc: $X_{k_0} \neq X_{k_0-1}$. Na mocy definicji rodziny \mathbb{R} mamy:

- (i) $X_{k_0-1} \cup \{\gamma_{k_0-1}\} \not\vdash_{krz} \alpha$
- (ii) $X_{k_0} = \{\delta : X_{k_0-1} \cup \{\gamma_{k_0-1}\} \vdash_{krz} \delta\}$.

Jednak skoro $\alpha \in X_{k_0}$, to $X_{k_0-1} \cup \{\gamma_{k_0-1}\} \vdash_{krz} \alpha$. Otrzymujemy zatem sprzeczność. Ostatecznie, $\alpha \notin X_k$ dla wszystkich $X_k \in \mathbb{R}$.

Dowód (C). Tu z kolei przeprowadzimy dowód indukcyjny.

(CI) *Początkowy krok indukcji.* Załóżmy, że $X_1 \vdash_{krz} \beta$. Pokażemy, że $\beta \in X_1$.

Skoro $X_1 \vdash_{krz} \beta$, to istnieje skończony ciąg $B = \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \rangle$ taki, że β jest identyczna z β_n , a każdy element tego ciągu jest bądź aksjomatem, bądź założeniem (czyli elementem zbioru X_1), bądź powstał z wyrazów wcześniejszych w tym ciągu poprzez zastosowanie reguły odrywania RO. Niech $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m}$ będą wszystkimi **założeniami** występującymi w ciągu B (czyli elementami zbioru X_1).

Wtedy $\{\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m}\} \subseteq X_1$ oraz $\{\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m}\} \vdash_{krz} \beta$. Ponieważ $X_1 = \{\delta : X \vdash_{krz} \delta\}$, więc (na mocy twierdzenia 5.2.4.):

$$X \vdash_{krz} \{\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m}\}.$$

Z przechodniości relacji \vdash_{krz} otrzymujemy $X \vdash_{krz} \beta$, czyli $\beta \in X_1$.

(CI) *Następnikowy krok indukcji.* Zakładamy, że: jeżeli $X_k \vdash_{krz} \beta$, to $\beta \in X_k$. Musimy pokazać, że: jeżeli $X_{k+1} \vdash_{krz} \beta$, to $\beta \in X_{k+1}$.

Założmy, że $X_{k+1} \vdash_{krz} \beta$. Są dwie możliwości:

- (c1) $X_k = X_{k+1}$
- (c2) $X_k = \{\delta : X_k \cup \{\gamma_k\} \vdash_{krz} \delta\}$.

W przypadku (c1) mamy natychmiast $\beta \in X_{k+1}$, na mocy założenia indukcyjnego.

W przypadku (c2) mamy $X_k = \{\delta : X_k \cup \{\gamma_k\} \vdash_{krz} \delta\}$ i $X_{k+1} \vdash_{krz} \beta$. Skoro $X_{k+1} \vdash_{krz} \beta$, to istnieje skończony ciąg $B = \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \rangle$ taki, że β jest identyczna z β_n , a każdy element tego ciągu jest bądź aksjomatem, bądź założeniem (czyli elementem zbioru X_{k+1}), bądź powstał z wyrazów wcześniejszych w tym ciągu poprzez zastosowanie reguły odrywania RO. Niech $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m}$ będą wszystkimi **założeniami** występującymi w ciągu B (czyli elementami zbioru X_{k+1}).

Wtedy $\{\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m}\} \subseteq X_{k+1}$ oraz $\{\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m}\} \vdash_{krz} \beta$. Z definicji zbioru X_{k+1} mamy: $X_k \cup \{\gamma_k\} \vdash_{krz} \{\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m}\}$. Z przechodniości relacji \vdash_{krz} otrzymujemy $X_k \cup \{\gamma_k\} \vdash_{krz} \beta$, czyli $\beta \in X_{k+1}$.

Rodzina \mathbb{R} posłuży teraz do definicji zbioru $L^\alpha(X)$ występującego w twierdzeniu 5.7. Niech:

$$L^\alpha(X) = \bigcup \mathbb{R}.$$

Trzeba pokazać, że zbiór $L^\alpha(X)$ ma własności wymienione w twierdzeniu 5.7.

(1). Pokażemy, że $\alpha \notin L^\alpha(X)$.

Przypuśćmy (nie wprost), że $\alpha \in L^\alpha(X)$. Z założenia twierdzenia, mamy $X \not\vdash_{krz} \alpha$, a więc $\alpha \notin X$. Skoro $\alpha \in L^\alpha(X)$, to $\alpha \in \bigcup \mathbb{R}$. Istnieje zatem $k \in \mathcal{N}$ taka, że $\alpha \in X_k$. Jest to jednak sprzeczne z udowodnioną wcześniej własnością (B). Tak więc, $\alpha \notin L^\alpha(X)$.

(2). Inkluzja $X \subseteq L^\alpha(X)$ jest oczywista, na mocy definicji zbioru $L^\alpha(X)$.

(3). Załóżmy, że $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta$. Musimy pokazać, że $\beta \in L^\alpha(X)$.

Skoro $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta$, to istnieje skończony ciąg $B = \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \rangle$, który jest wyprowadzeniem (dowodem) formuły β ze zbioru $L^\alpha(X)$.

Niech $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m}$ będą wszystkimi założeniami w tym dowodzie (tj. elementami $L^\alpha(X)$). Ponieważ $X \subseteq X_1$ oraz zbiory X_k tworzą \subseteq -łańcuch wstępujący (zob. własność (A)), więc istnieje $i_0 \geq 1$ taka, że $\{\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m}\} \subseteq X_{i_0}$.

Stąd $X_{i_0} \vdash_{krz} \{\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m}\}$ oraz $\{\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m}\} \vdash_{krz} \beta$. Na mocy przechodniości relacji \vdash_{krz} mamy więc: $X_{i_0} \vdash_{krz} \beta$. To oznacza (na mocy własności (C)), że $\beta \in X_{i_0}$. Ponieważ $X_{i_0} \subseteq L^\alpha(X)$, więc mamy ostatecznie: $\beta \in L^\alpha(X)$.

(4). Musimy teraz pokazać, że dla dowolnej formuły β : jeśli $\beta \notin L^\alpha(X)$, to $L^\alpha(X) \cup \{\beta\} \vdash_{krz} \alpha$.

Niech $\beta \notin L^\alpha(X)$. Ponieważ ciąg Γ był wyliczeniem *wszystkich* formuł języka KRZ, więc istnieje taka liczba naturalna n , że β jest identyczna z γ_n . Weźmy pod uwagę zbiór X_{n+1} . Na mocy definicji rodziny \mathbb{R} , zachodzi jeden z dwóch przypadków:

- (4a) $X_{n+1} = X_n$
- (4b) $X_{n+1} = \{\delta : X_n \cup \{\gamma_n\} \vdash_{krz} \delta\}$.

Przypadek (4a) zachodzi, gdy $X_n \cup \{\gamma_n\} \vdash_{krz} \alpha$. Wtedy $X_n \cup \{\beta\} \vdash_{krz} \alpha$ (ponieważ β jest identyczna z γ_n). Z monotoniczności relacji \vdash_{krz} mamy wtedy: $L^\alpha(X) \cup \{\beta\} \vdash_{krz} \alpha$, a to właśnie należało udowodnić.

Zauważmy jeszcze, że skoro $\beta \notin L^\alpha(X)$, to przypadek (4b) jest wykluczony. Ponieważ β jest identyczna z γ_n , więc $\{\gamma_n\} \vdash_{krz} \beta$, a nadto $X_n \cup \{\gamma_n\} \vdash_{krz} \beta$. Mamy zatem: $\beta \in \{\delta : X_n \cup \{\gamma_n\} \vdash_{krz} \delta\}$. Oznacza to, na mocy definicji rodziny \mathbb{R} , że $\beta \in X_{n+1}$, a więc automatycznie $\beta \in L^\alpha(X)$, co przeczy poczynionemu założeniu.

Q.E.D.

Twierdzenie 5.8. Dla dowolnych formuł α, β, γ oraz zbioru formuł X zachodzą równoważności:

- (1) $\beta \wedge \gamma \in L^\alpha(X)$ wttw, gdy $(\beta \in L^\alpha(X) \text{ oraz } \gamma \in L^\alpha(X))$
- (2) $\beta \vee \gamma \in L^\alpha(X)$ wttw, gdy $(\beta \in L^\alpha(X) \text{ lub } \gamma \in L^\alpha(X))$
- (3) $\beta \rightarrow \gamma \in L^\alpha(X)$ wttw, gdy (jeśli $\beta \in L^\alpha(X)$, to $\gamma \in L^\alpha(X)$)

- (4) $\beta \equiv \gamma \in L^\alpha(X)$ wttw, gdy $(\beta \in L^\alpha(X) \text{ wtedy i tylko wtedy, gdy } \gamma \in L^\alpha(X))$
- (5) $\neg\beta$ jest elementem $L^\alpha(X)$ wttw, gdy β nie jest elementem $L^\alpha(X)$.

DOWÓD. Dla każdego z punktów (1)–(5) udowodnić należy implikację prostą i odwrotną.

Dowód (1).

Dowód \Rightarrow .

Założmy, że $\beta \wedge \gamma \in L^\alpha(X)$. Wtedy $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta \wedge \gamma$. Nadto:

- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} (\beta \wedge \gamma) \rightarrow \beta$ ((A4): $\alpha/\beta, \beta/\gamma$)
- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} (\beta \wedge \gamma) \rightarrow \gamma$ ((A5): $\alpha/\beta, \beta/\gamma$)

Ponieważ $\{\beta \wedge \gamma, (\beta \wedge \gamma) \rightarrow \beta, (\beta \wedge \gamma) \rightarrow \gamma\} \vdash_{krz} \{\beta, \gamma\}$, więc z przechodniości relacji \vdash_{krz} wynika, że $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \{\beta, \gamma\}$. Oznacza to, że:

- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta$ oraz
- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \gamma$.

Na mocy twierdzenia 5.7.(3) mamy stąd, że: $\beta \in L^\alpha(X)$ oraz $\gamma \in L^\alpha(X)$.

Dowód \Leftarrow .

Założmy, że $\beta \in L^\alpha(X)$ oraz $\gamma \in L^\alpha(X)$. Na mocy twierdzenia 5.2.(1) oraz 5.2.(3) otrzymujemy stąd:

- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta$ oraz
- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \gamma$.

Zauważmy, że formuła $\beta \rightarrow (\gamma \rightarrow (\beta \wedge \gamma))$ jest tezą KRZ (otrzymujemy ją z (T15) przez podstawienie $\alpha/\beta, \beta/\gamma$). Ponieważ $\emptyset \vdash_{krz} \beta \rightarrow (\gamma \rightarrow (\beta \wedge \gamma))$, więc (z monotoniczności \vdash_{krz}) także $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta \rightarrow (\gamma \rightarrow (\beta \wedge \gamma))$. Mamy zatem: $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \{\beta \rightarrow (\gamma \rightarrow (\beta \wedge \gamma)), \beta, \gamma\}$. Łatwo pokazać (stosując dwukrotnie regułę odrywania RO), że: $\{\beta \rightarrow (\gamma \rightarrow (\beta \wedge \gamma)), \beta, \gamma\} \vdash_{krz} \beta \wedge \gamma$. Z przechodniości relacji \vdash_{krz} mamy $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta \wedge \gamma$. Wreszcie, na mocy twierdzenia 5.7.(3) otrzymujemy stąd, że: $\beta \wedge \gamma \in L^\alpha(X)$.

Dowód (2).**Dowód** \Rightarrow .

Dowód przeprowadzimy metodą nie wprost. Załóżmy, że $\beta \vee \gamma \in L^\alpha(X)$ i przypuśćmy, że: $\beta \notin L^\alpha(X)$ oraz $\gamma \notin L^\alpha(X)$. Skoro $\beta \vee \gamma \in L^\alpha(X)$, to $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta \vee \gamma$. Z przypuszczeń, iż $\beta \notin L^\alpha(X)$ oraz $\gamma \notin L^\alpha(X)$ oraz z twierdzenia 5.7.(4) wynika, że:

- $L^\alpha(X) \cup \{\beta\} \vdash_{krz} \alpha$ oraz
- $L^\alpha(X) \cup \{\gamma\} \vdash_{krz} \alpha$.

Na mocy twierdzenia o dedukcji wprost otrzymujemy stąd, że:

- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta \rightarrow \alpha$ oraz
- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \gamma \rightarrow \alpha$.

Zauważmy, że $\emptyset \vdash_{krz} (\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\gamma \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\beta \vee \gamma) \rightarrow \alpha))$, ponieważ $(\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\gamma \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\beta \vee \gamma) \rightarrow \alpha))$ jest podstawieniem aksjomatu (A9): $\alpha/\beta, \beta/\alpha$. Z monotoniczności relacji \vdash_{krz} mamy zatem:

$$L^\alpha(X) \vdash_{krz} (\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\gamma \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\beta \vee \gamma) \rightarrow \alpha)).$$

Otrzymujemy więc:

$$L^\alpha(X) \vdash_{krz} \{\beta \vee \gamma, \beta \rightarrow \alpha, \gamma \rightarrow \alpha, (\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\gamma \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\beta \vee \gamma) \rightarrow \alpha))\}.$$

Stąd, przez trzykrotne zastosowanie reguły odrywania RO, otrzymujemy:

$$\{\beta \vee \gamma, \beta \rightarrow \alpha, \gamma \rightarrow \alpha, (\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\gamma \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\beta \vee \gamma) \rightarrow \alpha))\} \vdash_{krz} \alpha.$$

Z przechodniości relacji \vdash_{krz} mamy: $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \alpha$, a stąd, na mocy twierdzenia 5.7.(3) otrzymujemy: $\alpha \in L^\alpha(X)$. To daje sprzeczność z twierdzeniem 5.7.(1) i kończy dowód. Przypuszczenie nie wprost trzeba odrzucić. Pokazaliśmy zatem, że: $\beta \in L^\alpha(X)$ lub $\gamma \in L^\alpha(X)$.

Dowód \Leftarrow .

(i) Załóżmy, że $\beta \in L^\alpha(X)$. Oznacza to, że $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta$. Mamy również: $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta \rightarrow (\beta \vee \gamma)$, bo:

- formułę $\beta \rightarrow (\beta \vee \gamma)$ otrzymujemy z aksjomatu (A7) przez podstawienie $\alpha/\beta, \beta/\gamma$
- relacja \vdash_{krz} jest monotoniczna.

Mamy więc $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \{\beta, \beta \rightarrow (\beta \vee \gamma)\}$.

Ponieważ $\{\beta, \beta \rightarrow (\beta \vee \gamma)\} \vdash_{krz} \beta \vee \gamma$, więc $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta \vee \gamma$. Na mocy twierdzenia 5.7.(3) otrzymujemy, że $\beta \vee \gamma \in L^\alpha(X)$.

(ii) Załóżmy, że $\gamma \in L^\alpha(X)$. Oznacza to, że $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \gamma$. Mamy również: $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \gamma \rightarrow (\beta \vee \gamma)$, bo:

- formułę $\gamma \rightarrow (\beta \vee \gamma)$ otrzymujemy z aksjomatu (A8) przez podstawienie $\alpha/\beta, \beta/\gamma$
- relacja \vdash_{krz} jest monotoniczna.

Mamy więc $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \{\gamma, \gamma \rightarrow (\beta \vee \gamma)\}$.

Ponieważ $\{\gamma, \gamma \rightarrow (\beta \vee \gamma)\} \vdash_{krz} \beta \vee \gamma$, więc $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta \vee \gamma$. Na mocy twierdzenia 5.7.(3) otrzymujemy, że $\beta \vee \gamma \in L^\alpha(X)$.

Dowód (3).

Dowód \Rightarrow .

Dowód przeprowadzimy metodą nie wprost. Załóżmy, że $\beta \rightarrow \gamma \in L^\alpha(X)$ oraz $\beta \in L^\alpha(X)$ i przypuśćmy, że $\gamma \notin L^\alpha(X)$. Na mocy zwrotności i monotoniczności \vdash_{krz} mamy: $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \{\beta \rightarrow \gamma, \beta\}$. Ponieważ $\{\beta \rightarrow \gamma, \beta\} \vdash_{krz} \gamma$, więc z przechodniości \vdash_{krz} mamy: $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \gamma$. A to oznacza, na mocy twierdzenia 5.7.(3), że $\gamma \in L^\alpha(X)$. Otrzymaliśmy sprzeczność z przypuszczeniem, które zatem należy odrzucić. Ostatecznie: jeśli $\beta \rightarrow \gamma \in L^\alpha(X)$, to jeżeli $\beta \in L^\alpha(X)$, to również $\gamma \in L^\alpha(X)$.

Dowód \Leftarrow .

Załóżmy, że: jeśli $\beta \in L^\alpha(X)$, to również $\gamma \in L^\alpha(X)$. Oznacza to, że zachodzi alternatywa:

- (1) $\beta \notin L^\alpha(X)$ **lub**
- (2) $\gamma \in L^\alpha(X)$.

Trzeba rozpatrzeć oddzielnie każdy z tych przypadków.

Przypadek (1). Prowadzimy dowód metodą nie wprost. Załóżmy, że $\beta \notin L^\alpha(X)$ i przypuśćmy, że $\beta \rightarrow \gamma \notin L^\alpha(X)$.

Ponieważ $\beta \rightarrow \gamma \notin L^\alpha(X)$, więc $L^\alpha(X) \cup \{\beta \rightarrow \gamma\} \vdash_{krz} \alpha$, na mocy twierdzenia 5.7.(4). Stąd, na mocy twierdzenia o dedukcji wprost, otrzymujemy $L^\alpha(X) \vdash_{krz} (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \alpha$. Skoro $\beta \notin L^\alpha(X)$, to $L^\alpha(X) \cup \{\beta\} \vdash_{krz} \alpha$, na mocy twierdzenia 5.7.(4). Ponownie korzystając z twierdzenia o dedukcji wprost, otrzymujemy: $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta \rightarrow \alpha$. Zatem $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \{(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \alpha, \beta \rightarrow \alpha\}$.

Jak pamiętamy z wykładu, formuła $((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow \beta)$ jest tezą KRZ (teza (T17)). Dokonując w (T17) podstawienia α/β , β/γ , γ/α otrzymujemy, na mocy monotoniczności relacji \vdash_{krz} :

$$L^\alpha(X) \vdash_{krz} ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha).$$

Pokazaliśmy więc, że:

$$L^\alpha(X) \vdash_{krz} \{(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \alpha, \beta \rightarrow \alpha, ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)\}.$$

Ponadto (jak łatwo sprawdzić, stosując dwukrotnie regułę odrywania RO):

$$\{(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \alpha, \beta \rightarrow \alpha, ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)\} \vdash_{krz} \alpha.$$

Z przechodniości relacji \vdash_{krz} otrzymujemy: $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \alpha$. Stąd, na mocy twierdzenia 5.7.(3) mamy: $\alpha \in L^\alpha(X)$, a to jest sprzeczne z twierdzeniem 5.7.(1). Tak więc, przypuszczenie, że $\beta \rightarrow \gamma \notin L^\alpha(X)$ należy odrzucić. Ostatecznie: $\beta \rightarrow \gamma \in L^\alpha(X)$.

Przypadek (2). Niech $\gamma \in L^\alpha(X)$. Wtedy $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \gamma$. Na mocy reguły poprzedzania RPP mamy: $\{\gamma\} \vdash_{krz} \beta \rightarrow \gamma$. Z przechodniości relacji \vdash_{krz} otrzymujemy $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta \rightarrow \gamma$. Wreszcie, na mocy twierdzenia 5.7.(3), mamy: $\beta \rightarrow \gamma \in L^\alpha(X)$.

Dowód (4).

Dowód \Rightarrow .

Należy rozpatrzeć dwa przypadki:

- (1) Zakładamy, że $\beta \equiv \gamma \in L^\alpha(X)$ oraz $\beta \in L^\alpha(X)$. Należy wtedy pokazać, że $\gamma \in L^\alpha(X)$.
- (2) Zakładamy, że $\beta \equiv \gamma \in L^\alpha(X)$ oraz $\gamma \in L^\alpha(X)$. Należy wtedy pokazać, że $\beta \in L^\alpha(X)$.

Przypadek (1). Na mocy przyjętych założeń oraz twierdzenia 5.7.(3) mamy:

- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta \equiv \gamma$ oraz
- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta$.

Z aksjomatu (A10) (przy podstawieniu α/β , β/γ) oraz z monotoniczności relacji \vdash_{krz} otrzymujemy: $L^\alpha(X) \vdash_{krz} (\beta \equiv \gamma) \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$. Mamy więc:

$$L^\alpha(X) \vdash_{krz} \{\beta, \beta \equiv \gamma, (\beta \equiv \gamma) \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)\}.$$

Ponadto, jak łatwo sprawdzić (stosując dwukrotnie regułę odrywania RO):

$$\{\beta, \beta \equiv \gamma, (\beta \equiv \gamma) \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)\} \vdash_{krz} \gamma.$$

Z przechodniości relacji \vdash_{krz} otrzymujemy $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \gamma$, a stąd, na mocy twierdzenia 5.7.(3): $\gamma \in L^\alpha(X)$.

Przypadek (2). Na mocy przyjętych założeń oraz twierdzenia 5.7.(3) mamy:

- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta \equiv \gamma$ oraz
- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \gamma$.

Z aksjomatu (A11) (przy podstawieniu α/β , β/γ) oraz z monotoniczności relacji \vdash_{krz} otrzymujemy: $L^\alpha(X) \vdash_{krz} (\beta \equiv \gamma) \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta)$. Mamy więc:

$$L^\alpha(X) \vdash_{krz} \{\gamma, \beta \equiv \gamma, (\beta \equiv \gamma) \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta)\}.$$

Ponadto, jak łatwo sprawdzić (stosując dwukrotnie regułę odrywania RO):

$$\{\gamma, \beta \equiv \gamma, (\beta \equiv \gamma) \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta)\} \vdash_{krz} \beta.$$

Z przechodniości relacji \vdash_{krz} otrzymujemy $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta$, a stąd, na mocy twierdzenia 5.7.(3): $\beta \in L^\alpha(X)$.

Dowód \Leftarrow .

Założmy, że: $\beta \in L^\alpha(X)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\gamma \in L^\alpha(X)$. Musimy pokazać, że $\beta \equiv \gamma \in L^\alpha(X)$.

Z przyjętych założeń wynika, że:

- jeśli $\beta \in L^\alpha(X)$, to $\gamma \in L^\alpha(X)$ oraz
- jeśli $\gamma \in L^\alpha(X)$, to $\beta \in L^\alpha(X)$.

Na mocy wyżej udowodnionego punktu (3) twierdzenia 5.8. otrzymujemy:

- $\beta \rightarrow \gamma \in L^\alpha(X)$ oraz
- $\gamma \rightarrow \beta \in L^\alpha(X)$.

Z powyższego (oraz z twierdzenia 5.7.(3)), mamy:

$$L^\alpha(X) \vdash_{krz} \{\beta \rightarrow \gamma, \gamma \rightarrow \beta\}.$$

Dokonując w (A11) podstawienia α/β , β/γ i korzystając z monotoniczności relacji \vdash_{krz} otrzymujemy: $L^\alpha(X) \vdash_{krz} (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\gamma \rightarrow \beta) \rightarrow (\beta \equiv \gamma))$. Pokazaliśmy zatem, że:

$$L^\alpha(X) \vdash_{krz} \{\beta \rightarrow \gamma, \gamma \rightarrow \beta, (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\gamma \rightarrow \beta) \rightarrow (\beta \equiv \gamma))\}.$$

Dwukrotnie stosując regułę odrywania RO pokazujemy, że:

$$\{\beta \rightarrow \gamma, \gamma \rightarrow \beta, (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\gamma \rightarrow \beta) \rightarrow (\beta \equiv \gamma))\} \vdash_{krz} \beta \equiv \gamma.$$

Z przechodniości relacji \vdash_{krz} otrzymujemy $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta \equiv \gamma$, a stąd, na mocy twierdzenia 5.7.(3) dostajemy ostatecznie $\beta \equiv \gamma \in L^\alpha(X)$.

Dowód (5).

Dowód \Rightarrow .

Dowód przeprowadzimy metodą nie wprost. Załóżmy, że β jest elementem $L^\alpha(X)$ i przypuśćmy, że $\neg\beta$ także jest elementem $L^\alpha(X)$. Wtedy:

- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \neg\beta$ oraz
- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta$.

Podstawiając w (T3) α/β , β/α i korzystając z monotoniczności relacji \vdash_{krz} otrzymujemy: $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \neg\beta \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$. Stąd mamy:

$$L^\alpha(X) \vdash_{krz} \{\neg\beta, \beta, \neg\beta \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)\}.$$

Dwukrotne zastosowanie reguły odrywania RO pokazuje, że:

$$\{\neg\beta, \beta, \neg\beta \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)\} \vdash_{krz} \alpha.$$

Stąd, na mocy monotoniczności relacji \vdash_{krz} , mamy: $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \alpha$. To jednak jest sprzeczne z twierdzeniem 5.7.(1). Przypuszczenie, że $\neg\beta$ jest elementem $L^\alpha(X)$ trzeba odrzucić. Ostatecznie zatem: $\neg\beta$ nie jest elementem $L^\alpha(X)$.

Dowód \Leftarrow .

Dowód przeprowadzimy metodą nie wprost. Załóżmy, że $\neg\beta$ nie jest elementem $L^\alpha(X)$ i przypuśćmy, że β także nie jest elementem $L^\alpha(X)$. Wtedy, na mocy twierdzenia 5.7.(4):

- $L^\alpha(X) \cup \{\beta\} \vdash_{krz} \alpha$ oraz
- $L^\alpha(X) \cup \{\neg\beta\} \vdash_{krz} \alpha$.

Stąd, na mocy twierdzenia o dedukcji wprost, otrzymujemy:

- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \beta \rightarrow \alpha$ oraz
- $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \neg\beta \rightarrow \alpha$.

Dokonując w (T16) podstawienia α/β , β/α i korzystając z monotoniczności relacji \vdash_{krz} otrzymujemy:

$$L^\alpha(X) \vdash_{krz} (\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\neg\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha).$$

Pokazaliśmy więc, że:

$$L^\alpha(X) \vdash_{krz} \{\beta \rightarrow \alpha, \neg\beta \rightarrow \alpha, (\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\neg\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)\}.$$

Dwukrotne zastosowanie reguły odrywania RO pokazuje, że:

$$\{\beta \rightarrow \alpha, \neg\beta \rightarrow \alpha, (\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\neg\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)\} \vdash_{krz} \alpha.$$

Stąd i z przechodniości relacji \vdash_{krz} wynika, że $L^\alpha(X) \vdash_{krz} \alpha$. Na mocy twierdzenia 5.7.(3) oznacza to, że $\alpha \in L^\alpha(X)$, co jednak jest sprzeczne z twierdzeniem 5.7.(1). Przypuszczenie, że β nie jest elementem $L^\alpha(X)$ trzeba zatem odrzucić. Ostatecznie, β jest elementem $L^\alpha(X)$.

Q.E.D.

Twierdzenie 5.9. (TWIERDZENIE O PEŁNOŚCI KRZ.)

Dla dowolnej formuły α zachodzi równoważność: α jest tezą KRZ wtedy i tylko wtedy, gdy α jest tautologią KRZ.

DOWÓD.

Należy udowodnić implikację prostą oraz odwrotną, składające się na tezę 5.9.

Dowód \Rightarrow .

Dowód tej implikacji to dowód twierdzenia o trafności aksjomatyki (twierdzenia 5.6.), który już przeprowadziliśmy.

Dowód \Leftarrow .

Dowód przeprowadzimy metodą nie wprost. Załóżmy, że formuła α jest tautologią KRZ i przypuśćmy, że α nie jest tezą KRZ.

Ponieważ α nie jest tezą, to $\emptyset \not\models_{krz} \alpha$. Istnieje zatem α -relatywny nadzbiór Lindenbauma $L^\alpha(\emptyset)$ o własnościach podanych w twierdzeniach 5.7. oraz 5.8.

Niech $h : F_{KRZ} \rightarrow \{0, 1\}$ będzie funkcją charakterystyczną zbioru $L^\alpha(\emptyset)$, tj. dla każdego $\beta \in F_{KRZ}$:

- $h(\beta) = 1$, gdy $\beta \in L^\alpha(\emptyset)$
- $h(\beta) = 0$, gdy $\beta \notin L^\alpha(\emptyset)$.

Pokażemy, że:

- (1) $h(\alpha) = 0$ oraz
- (2) h jest wartościowaniem formuł języka KRZ.

Punkt (1) wynika bezpośrednio z definicji h oraz z twierdzenia 5.7.(1), ponieważ $\alpha \notin L^\alpha(\emptyset)$.

W dowodzie punktu (2) korzystamy z twierdzenia 5.8. Trzeba pokazać, że funkcja h spełnia warunki definiujące wartościowanie w KRZ, tj. że:

- (2.1.) $h(\beta \wedge \gamma) = 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy $h(\beta) = 1$ i $h(\gamma) = 1$
- (2.2.) $h(\beta \vee \gamma) = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $h(\beta) = 0$ i $h(\gamma) = 0$
- (2.3.) $h(\beta \rightarrow \gamma) = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $h(\beta) = 1$ i $h(\gamma) = 0$
- (2.4.) $h(\beta \equiv \gamma) = 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy $h(\beta) = h(\gamma)$

- (2.5.) $h(\neg\beta) = 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy $h(\beta) = 0$.

Dowód (2.1.).

$h(\beta \wedge \gamma) = 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\beta \wedge \gamma \in L^\alpha(\emptyset)$. Na mocy twierdzenia 5.8.(1), $\beta \wedge \gamma \in L^\alpha(\emptyset)$ wtedy i tylko wtedy, gdy: $\beta \in L^\alpha(\emptyset)$ i $\gamma \in L^\alpha(\emptyset)$. To oznacza, na mocy definicji funkcji h , że $h(\beta) = 1$ i $h(\gamma) = 1$.

Dowód (2.2.).

$h(\beta \vee \gamma) = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\beta \vee \gamma \notin L^\alpha(\emptyset)$. Na mocy twierdzenia 5.8.(2), $\beta \vee \gamma \notin L^\alpha(\emptyset)$ wtedy i tylko wtedy, gdy: $\beta \notin L^\alpha(\emptyset)$ i $\gamma \notin L^\alpha(\emptyset)$. To oznacza, na mocy definicji funkcji h , że $h(\beta) = 0$ i $h(\gamma) = 0$.

Dowód (2.3.).

$h(\beta \rightarrow \gamma) = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\beta \rightarrow \gamma \notin L^\alpha(\emptyset)$. Na mocy twierdzenia 5.8.(3), $\beta \rightarrow \gamma \notin L^\alpha(\emptyset)$ wtedy i tylko wtedy, gdy: $\beta \in L^\alpha(\emptyset)$ i $\gamma \notin L^\alpha(\emptyset)$. To oznacza, na mocy definicji funkcji h , że $h(\beta) = 1$ i $h(\gamma) = 0$.

Dowód (2.4.).

$h(\beta \equiv \gamma) = 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\beta \equiv \gamma \in L^\alpha(\emptyset)$. Na mocy twierdzenia 5.8.(4), $\beta \equiv \gamma \in L^\alpha(\emptyset)$ wtedy i tylko wtedy, gdy: $\beta \in L^\alpha(\emptyset)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\gamma \in L^\alpha(\emptyset)$. Zachodzi to w dwóch przypadkach:

- (i) $\beta \in L^\alpha(\emptyset)$ i $\gamma \in L^\alpha(\emptyset)$ **lub**
- (ii) $\beta \notin L^\alpha(\emptyset)$ i $\gamma \notin L^\alpha(\emptyset)$.

Na mocy definicji funkcji h mamy stąd:

- $h(\beta) = 1$ i $h(\gamma) = 1$ **lub**
- $h(\beta) = 0$ i $h(\gamma) = 0$.

Mamy zatem:

- $h(\beta) = h(\gamma) = 1$ **lub**
- $h(\beta) = h(\gamma) = 0$.

Ostatecznie, mamy: $h(\beta) = h(\gamma)$.

Dowód (2.5.).

$h(\neg\beta) = 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\neg\beta$ jest elementem $L^\alpha(\emptyset)$. Na mocy twierdzenia 5.8.(5), $\neg\beta$ jest elementem $L^\alpha(\emptyset)$ wtedy i tylko wtedy, gdy β nie jest elementem $L^\alpha(\emptyset)$. To, że β nie jest elementem $L^\alpha(\emptyset)$ jest z kolei równoważne temu, że $h(\beta) = 0$.

Formuła α ma przy wartościowaniu h wartość 0, a więc nie jest tautologią, co jest sprzeczne z założeniem. Należy więc odrzucić przypuszczenie (nie wprost), że α nie jest tezą. Ostatecznie, α jest tezą KRZ.

Q.E.D.

Twierdzenie 5.10. Dla dowolnego zbioru formuł X oraz formuły α zachodzi równoważność: $X \vdash_{krz} \alpha$ wtedy i tylko wtedy, gdy $X \models_{KRZ} \alpha$.

DOWÓD. Należy udowodnić implikację prostą oraz odwrotną, składające się na tezę 5.10.

Dowód \Rightarrow .

Założmy, że $X \vdash_{krz} \alpha$. Wtedy istnieje skończony ciąg formuł

$$\Gamma = \langle \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n \rangle$$

taki, że: α jest identyczna z γ_n , a każdy wyraz ciągu Γ jest bądź założeniem (tj. elementem zbioru X), bądź aksjomatem opartym na jednym ze schematów (A1)–(A13), bądź powstaje z elementów wcześniejszych w ciągu Γ poprzez zastosowanie reguły odrywania RO.

Pokażemy, używając indukcji matematycznej, że każdy element ciągu Γ wynika logicznie z X , tj. że $X \models_{KRZ} \gamma_i$ dla wszystkich $1 \leq i \leq n$.

I. *Początkowy krok indukcyjny.* Pokażemy, że $X \models_{KRZ} \gamma_1$. Zauważmy, że γ_1 musi być: albo aksjomatem, albo założeniem.

Jeśli γ_1 jest aksjomatem, to jest też tautologią KRZ. Mamy więc: $\emptyset \models_{KRZ} \gamma_1$. Z uwagi na monotoniczność relacji \models_{KRZ} mamy: $X \models_{KRZ} \gamma_1$.

Jeśli γ_1 jest założeniem, to $\gamma_1 \in X$ i ze zwrotności relacji \models_{KRZ} otrzymujemy, iż $X \models_{KRZ} \gamma_1$.

Następnikowy krok indukcyjny. Założmy, że wszystkie elementy ciągu Γ o numerach $\leq k$ (gdzie $k < n$) wynikają logicznie ze zbioru X , tj. że: $X \models_{KRZ} \gamma_i$ dla wszystkich $i \leq k$. Pokażemy, że zachodzi wtedy: $X \models_{KRZ} \gamma_{k+1}$.

Są możliwe trzy przypadki:

- (1) γ_{k+1} jest aksjomatem,

- (2) γ_{k+1} jest założeniem,
- (3) γ_{k+1} powstała z elementów wcześniejszych w ciągu Γ poprzez zastosowanie reguły odrywania RO.

W przypadkach (1) i (2) postępujemy analogicznie, jak w początkowym kroku indukcyjnym i pokazujemy, że $X \models_{KRZ} \gamma_{k+1}$.

W przypadku (3), skoro γ_{k+1} powstała z elementów wcześniejszych w ciągu Γ przez zastosowanie reguły odrywania, to dla pewnych $m_1 < k+1$, $m_2 < k+1$ istnieją w ciągu Γ formuły γ_{m_1} oraz γ_{m_2} takie, że:

- γ_{m_1} jest identyczna z $\gamma_{m_2} \rightarrow \gamma_{k+1}$ **lub**
- γ_{m_2} jest identyczna z $\gamma_{m_1} \rightarrow \gamma_{k+1}$.

Na mocy założenia indukcyjnego, formuły γ_{m_1} oraz γ_{m_2} wynikają logicznie ze zbioru X . A zatem:

- $(X \models_{KRZ} \gamma_{m_1} \text{ i } X \models_{KRZ} \gamma_{m_1} \rightarrow \gamma_{k+1})$ **lub**
- $X \models_{KRZ} \gamma_{m_2} \text{ i } X \models_{KRZ} \gamma_{m_2} \rightarrow \gamma_{k+1}$.

Otrzymujemy z tego, że:

- $X \models_{KRZ} \{\gamma_{m_1}, \gamma_{m_1} \rightarrow \gamma_{k+1}\}$ **lub**
- $X \models_{KRZ} \{\gamma_{m_2}, \gamma_{m_2} \rightarrow \gamma_{k+1}\}$

Ponieważ reguła odrywania RO jest niezawodna, mamy:

- $\{\gamma_{m_1}, \gamma_{m_1} \rightarrow \gamma_{k+1}\} \models_{KRZ} \gamma_{k+1}$ **oraz**
- $\{\gamma_{m_2}, \gamma_{m_2} \rightarrow \gamma_{k+1}\} \models_{KRZ} \gamma_{k+1}$.

Na mocy przechodności \models_{KRZ} otrzymujemy z powyższego: $X \models_{KRZ} \gamma_{k+1}$

Dowód \Leftarrow .

Dowód przeprowadzimy metodą nie wprost. Założmy, że $X \models_{KRZ} \alpha$ i przypuśćmy, że $X \not\models_{krz} \alpha$.

Istnieje zatem α -relatywny nadzbiór Lindenbauma $L^\alpha(X)$ o własnościach podanych w twierdzeniach 5.7. oraz 5.8.

Niech $h : F_{KRZ} \rightarrow \{0, 1\}$ będzie funkcją charakterystyczną zbioru $L^\alpha(X)$, tj. dla każdego $\beta \in F_{KRZ}$:

- $h(\beta) = 1$, gdy $\beta \in L^\alpha(X)$
- $h(\beta) = 0$, gdy $\beta \notin L^\alpha(X)$.

Wtedy:

- (1) $h(\alpha) = 0$
- (2) h jest wartościowaniem formuł języka KRZ.

Dowód punktu (2) jest analogiczny do dowodu przeprowadzonego w poprzednim twierdzeniu: w miejsce $L^\alpha(\emptyset)$ wpisujemy $L^\alpha(X)$.

Dowód punktu (1) otrzymujemy bezpośrednio z twierdzenia 5.7.(1), czyli z faktu, że $\alpha \notin L^\alpha(X)$ oraz z definicji funkcji h .

Na mocy twierdzenia 5.7.(2) mamy: $X \subseteq L^\alpha(X)$. Stąd i z definicji funkcji h otrzymujemy inkluzję: $h[X] \subseteq \{1\}$. Ponieważ $h(\alpha) = 0$, więc wynika z tego, że $X \not\models_{KRZ} \alpha$, co jest sprzeczne z poczynionym założeniem. Musimy więc odrzucić przypuszczenie, że $X \not\models_{krz} \alpha$. Ostatecznie, mamy: $X \vdash_{krz} \alpha$.

Q.E.D.

* * *

WYKORZYSTYWANA LITERATURA:

- Batóg, T. 1999. *Podstawy logiki*. Wydawnictwo UAM, Poznań.
- Grzegorzczak, A. 1975. *Zarys logiki matematycznej*. PWN, Warszawa.
- Marek, I. 2002. *Elementy logiki formalnej*. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
- Pogorzelski, W.A. 1975. *Klasyczny rachunek zdań. Zarys teorii*. PWN, Warszawa.
- Pogorzelski, W.A. 1992. *Elementarny słownik logiki formalnej*. Białystok.
- Porębska, M., Suchoń, W. 1991. *Elementarne wprowadzenie w logikę formalną*. PWN, Warszawa.
- Surma, S. (red.) 1973. *Studies in the History of Mathematical Logic*. Ossolineum.

* * *

Podane wyżej dowody (z wyjątkiem szkicu dowodu twierdzenia 5.5.) pochodzą z podręcznika IWONY MAREK. Precyzyjny dowód twierdzeń 5.5.(e) oraz 5.5.(f) znaleźć można np. w podręczniku TADEUSZA BATOGA (strony: 82–87) lub w monografii WITOLDA POGORZELSKIEGO (strony: 85–97).

W monografii pod redakcją STANISŁAWA SURMY znajdujemy m.in. przegląd różnych technik dowodzenia twierdzeń o pełności oraz informacje historyczne.

* * *

JERZY POGONOWSKI
Zakład Logiki Stosowanej UAM
www.logic.amu.edu.pl